


علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول (8ن)

يقوم الكائن الحي بتجدد خلاياه خلال النمو لتوضيح ذلك نقترح الدراسة التالية :

تمثل الوثيقة التالية مجموعة من الصور جمعها أحد التلاميذ دون ترتيب و التي أنجزت لخلايا مرستيمية خلال مراحل مختلفة من حياتها أثناء التجدد .



1. رتب الصور حسب تسلسلها الزمني .

ثم حدد الظاهرة الحيوية التي مرت بها الخلية المرستيمية .

2. من خلال الوثيقة و معلوماتك لخص في نص على التغيرات التي تمس الصبغيات خلال الظاهرة المعنية و نتيجة ذلك .

التمرين الثاني (12ن)


لتتعرف على بعض الظروف والتغيرات التي طرأت على البذرة خلال مراحل حياتها نقوم بالدراسة التالية :

ا) تحتاج البذور لإنتاشها الماء و درجة الحرارة الملائمة . أردنا إختبار الفرضية التالية " إنماش البذور يتطلب توفر الضوء " من أجل ذلك أجريت التجربة التالية :

التجربة : قمنا بتغطية الجزء السفلي لعلبتيين بتري بواسطة قطن ثم وضعنا في كل علبة مجموعة من بذور العدس حيث وضعت المجموعتين في درجة حرارة ملائمة 18°C مع السقي المنظم . باقي الظروف و النتائج موضحة في الجدول التالي :

النتيجة	الظروف	المجموعة
جميع البذور العدس بدأت في الإنماش	في الظلام	A
جميع البذور العدس بدأت في الإنماش	في الضوء	B

ii) سمحت عملية وزن مجموعة من البذور B و الناتج عنها خلال مراحل مختلفة من حياتها بإنشاء المنحني البياني الممثل بالوثيقة 1.



1. ماذا تستخلص من التجربة ؟

2. ما هو رأيك في الفرضية ؟

1. حلل المنحني البياني

2. فسر تغيرات الوزن

خلال الفاصل الزمني ز2.....ز4

ثم خلال الفاصل الزمني ز4.....ز7

التمرين الأول:

- 0.5** ١ - ترتيب الخلايا حسب تسلسلها الزمني :
 - ١-أ ٢-و ٣-ه ٤-ج ٥-د ٦-ب
0.5 تحديد الظاهرة الحيوية التي مرت بها الخلية المرسومة :
 - الانقسام الخطي المتساوي
2 ٢ - التغيرات التي تمس الصبغيات :
مقدمة: تعريف النمو أو الانقسام
المشكل العلمي: ما هي التغيرات التي تمس الصبغيات تحديداً خلال الانقسام الخطي المتساوي؟
العرض:
 - الدور البيئي (أ) : الصبغيات غير واضحة ، مشكلة شبكة الصبغين (الكروماتين)
5 المرحلة التمهيدية (و) : - تظهر فيها الصبغيات في شكل شبكة من الخيوط الطويلة التي لا يمكن معرفة عددها.
 المرحلة الاستوانية (ه) : - تتوضع الصبغيات في منتصف الخلية وتكون في أوضاع ما يمكن حسب الرسم
 المرحلة الانفصالية (ج) : - يننشر الصبغي الاستوائي إلى كروماتيدين كل كروماتيد يهاجر إلى أحد قطبي الخلية
 (د) - المرحلة النهائية (د، ب) :
 - زوال الانتفاف الحلزوني للصبغيات مشكلة شبكة الصبغين
 - تحصل كل خلية بنت على نفس عدد الصبغيات الأبناء والمتماثلة مع الخلية الأم في كل منها ٢.
خاتمة: نتيجة الانقسام الخطي المتساوي:
02 - تتشكل خلستان بتناقل متشابهتان وتشبه الخلية الأم تكبر إحداثاً وتتميز في حين تدخل الثانية في إنقسام ثان.....

التمرين الثاني:

- 02** ١ - خلاصة التجربة
 - الضوء غير ضروري لانتشال البذور
01 ٢ - التحقق من الفرضية المقترحة
 - فرضية غير صحيحة
1.5 ١ - تحليل هذا المنحنى البياني:
 - يمثل المنحنى (وثيقة ①) تغيرات الوزن (غ) لمجموعة من البذور قبل وأثناء وبعد الإنتشال بدلاًة الزمن.
 - نلاحظ من ($z_0 \leftarrow z_2$) : قبل الإنتشال أن الوزن ثابت عند 40 غ.
 - نلاحظ من ($z_2 \leftarrow z_4$) : أثناء الإنتشال تناقص الوزن من 40 غ إلى 30 غ.
 - نلاحظ من ($z_4 \leftarrow z_7$) : بعد الإنتشال تزايد الوزن من 30 غ إلى 54 غ.
1.5 و منه نستنتج أن: وزن البذرة ينقص بداية الإنتشال لكن يزداد مع بداية تشكيل النبتة (الزيادة هي وزن النبتة)
03 ٢ - تفسير تغيرات الوزن خلال الفاصل الزمني (z_2, z_4) :
 - تناقص الوزن لأنه تم إستهلاك المخزون الغذائي الموجود في البذور **بعد تسيطها بالإندزيمات****03** خلال الفاصل الزمني ($z_4 - z_7$) :
 - تزايد عدد الأوراق وتفرع جذورها إذ أنها أصبحت تعتمد على المواد المعدنية الموجودة في الوسط لتركيب مادتها. **النسخ الكامل**