

التمرين الثاني : (04 نقاط)

k دالة عددية معرفة بـ : $k(x) = \sqrt{6-3x}$

و (C_k) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$
❖ جد D_k مجموعة تعريف الدالة k .

1.00 $D_k = \dots\dots\dots$ تكافئ $\dots\dots\dots$ بالتالي : $\dots\dots\dots$

❖ أدرس قابلية اشتقاق الدالة k عند العدد (-1) ثم فسر النتيجة هندسيا.

0.50 $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

1.00 $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

0.50 التفسير الهندسي : $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

❖ أحسب المشتقة $k'(x)$ ثم استنتج إشارتها على $]-\infty; 2[$

1.00 $k'(x) = \dots\dots\dots$

التمرين الثالث : (03 نقاط) -----

g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{3\}$ و g' دالتها المشتقة

$$g(x) = \alpha x + \beta + \frac{1}{3-x}$$

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

▪ أحسب المشتقة $g'(x)$ بدلالة العددين الحقيقيين α و β

1.00 $g'(x) = \dots\dots\dots$

▪ جد العددين الحقيقيين α و β بحيث أن المنحنى (C_g)

يقبل عند النقطة $A(2;1)$ مماسا شعاع توجي هو \vec{i}

1.50 $\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \dots\dots\dots \\ \beta = \dots\dots\dots \end{array} \right.$ أي : $\left\{ \begin{array}{l} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$ تكافئ : $\left\{ \begin{array}{l} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$

▪ استنتج نتيجة النهاية $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$ دون حساب

0.50 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \dots\dots\dots$

سلم

المدة : ساعة ونصف


2021/01/21

الفرض الثاني للثلاثي الأول في مادة الرياضيات للقسم 2 تر

اللقب : الاسم : النقطة : 20/

التمرين الأول : (03 نقاط)

f دالة قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} و f' دالتها المشتقة
 (C) منحنى الدالة f' في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$



◀ أكمل جدول إشارات المشتقة $f'(x)$ على \mathbb{R} .

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$				

0.50

0.50

0.50

◀ قيمة حدية للدالة f عند على المجال \mathbb{R}

◀ تمثل فاصلة نقطة الانعطاف للدالة f على المجال \mathbb{R}

◀ أكمل جدول تغيرات الدالة f على \mathbb{R} .

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$			

0.50

◀ أكتب معادلة المماس (D) لمنحنى الدالة f عند النقطة

ذات الإحداثيات $(0; -\sqrt{3})$

0.25

$y = \dots\dots\dots$

0.25

بالتالي : $(D) : y = \dots\dots\dots$

0.50

◀ المماس (D) منحنى الدالة f عند النقطة

ذات الإحداثيات $(0; -\sqrt{3})$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{k(x) - k(-1)}{x - (-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{6-3x^2} - 3^2}{(x+1)(\sqrt{6-3x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{6-3x-9}{(x+1)(\sqrt{6-3x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3x-3}{(x+1)(\sqrt{6-3x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3(x+1)}{(x+1)(\sqrt{6-3x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3}{\sqrt{6-3x} + 3} = \frac{-3}{6} \\ &= \frac{-1}{2} = k'(-1) \end{aligned}$$

0.50

التفسير الهندسي : المنحنى (C_k) يقبل مماس عند النقطة

0.50

ذات فاصلة (-1) معامل توجيهه $k'(-1)$ أي $\frac{-1}{2}$

❖ أحسب المشتقة $k'(x)$ ثم استنتج إشارتها على $]-\infty; 2[$

1.00

$$k'(x) = \frac{-3}{2\sqrt{6-3x}} < 0$$

التمرين الثالث : (03 نقاط) -----

g دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{3\}$ و g' دالتها المشتقة

$$g(x) = \alpha x + \beta + \frac{1}{3-x}$$

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

▪ أحسب المشتقة $g'(x)$ بدلالة العددين الحقيقيين α و β

1.00

$$g'(x) = \alpha + \frac{-(-1)}{(3-x)^2} = \alpha + \frac{1}{(3-x)^2}$$

▪ جد العددين الحقيقيين α و β بحيث أن المنحنى (C_g)

يقبل عند النقطة $A(2;1)$ مماسا شعاع توجيهه \vec{i}

1.50

$$\begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \end{cases} \text{ أي : } \begin{cases} 2\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + 1 = 0 \end{cases} \text{ تكافئ : } \begin{cases} g(2) = 1 \\ g'(2) = 0 \end{cases}$$

▪ استنتج نتيجة النهاية دون حساب $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$

0.50

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = g'(2) = 0$$

التمرين الأول : (03 نقاط)

f دالة قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} و f' دالتها المشتقة

◀ أكمل جدول إشارات المشتقة $f'(x)$ على \mathbb{R} .

0.50

x	$-\infty$	-5	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$

0.50


◀ $f(-5)$ قيمة حدية صغرى بالدالة f عند -5 على \mathbb{R}

0.50

◀ 0 يمثل فاصلة نقطة الانعطاف للدالة f على المجال \mathbb{R}

◀ أكمل جدول تغيرات الدالة f على \mathbb{R} .

0.50



◀ أكتب معادلة المماس (D) لمنحنى الدالة f عند النقطة

ذات الإحداثيات $(0; -\sqrt{3})$

0.25

$$y = f'(0) \times (x - 0) + f(0) = 0x - \sqrt{3}$$

0.25

بالتالي : $(D) : y = -\sqrt{3}$

0.50

◀ المماس (D) "يخترق" منحنى الدالة f عند النقطة

ذات الإحداثيات $(0; -\sqrt{3})$

التمرين الثاني : (04 نقاط) -----

k دالة عددية معرفة بـ : $k(x) = \sqrt{6-3x}$

و (C_k) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1.00

❖ جد D_k مجموعة تعريف الدالة k .

$6-3x \geq 0$ تكافئ $x \leq 2$ بالتالي : $D_k =]-\infty; 2]$

❖ أدرس قابلية اشتقاق الدالة k عند العدد (-1) ثم فسر

النتيجة هندسيا.

0.50

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{k(x) - k(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{6-3x} - \sqrt{6-3(-1)}}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{6-3x} - \sqrt{9}}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{6-3x} - 3}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{6-3x} - 3)(\sqrt{6-3x} + 3)}{(x+1)(\sqrt{6-3x} + 3)}$$