

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول : (6 نقط)

$a \equiv 3[11]$  و  $b \equiv 10[11]$  عدنان طبيعان حيث

(1) عين باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين  $b^2 + a^2$  و  $2a \times b$  على 11.

(2) أ) تحقق أن  $b \equiv -1[11]$ .

ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين  $b^{2017}$  و  $b^{1438}$  على 11.

(3) بين أن العدد  $A$  يقبل القسمة على 11 حيث :  $A = b^{2n+1} + 3b^{2n} + 20$ .

(4) عين الأعداد الطبيعية  $n$  الأصغر من أو تساوي 43 التي تحقق :  $(a + 2b)^{2n} + 12n \equiv 0[11]$

التمرين الثاني : (6 نقط)

$(U_n)$  متتالية حسابية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية ب :  $U_2 = 4$  و  $U_6 - 2U_3 = 2$

(1) عين أساس المتتالية وحدها الأول  $U_0$

(2) أكتب عبارة الحد العام للمتتالية  $(U_n)$  بدلالة  $n$ .

(3) أوجد رتبة الحد الذي يساوي 100 لهذه المتتالية.

(4) أ) أحسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

ب) استنتج المجموع  $\Gamma = U_0 + U_1 + \dots + U_{34}$

التمرين الثالث : (8 نقط)

I) دالة عددية معرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية  $\mathbb{R}$  كمايلي :

$g(x) = a - 3x^2$  حيث  $a$  عدد حقيقي، و  $(C_g)$  تمثيلها البياني المقابل

(1) عين بيانيا  $g(1)$  ثم عين قيمة  $a$ .


(2) بقراءة بيانية : أ) شكل جدول تغيرات الدالة  $g$

ب) عين إشارة  $g(x)$

II) الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  كمايلي :

$f(x) = -x^3 + 3x - 2$  وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$



- (1) أحسب نهايات الدالة  $f$  عند  $-\infty$  وعند  $+\infty$
- (2) أدرس اتجاه تغيرات الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .
- (3) بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل نقطة انعطاف  $I$  يطلب تعيين إحداثياتها.
- (4) أكتب معادلة المماس  $(\Delta)$  عند النقطة ذات الفاصلة  $x_0 = 0$ .
- (5) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن :  $f(x) = (x-1)(-x^2 - x + 2)$   
ب) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $f(x) = 0$  ثم أستنتج نقط تقاطع المنحنى  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل
- (6) أنشئ  $(\Delta)$  و  $(C_f)$

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (6 نقط)

أختر الإقتراح الصحيح من بين الإقتراحات الثلاثة في كل حالة مما يلي :

- (1) عدد قواسم العدد 9720 هو : أ) 24      ب) 48      ج) 15
- (2) العددان 2016 و 1436 متوافقان بترديد : أ) 7      ب) 5      ج) 9
- (3) إذا كان  $1[5] \equiv x + 2$  فإن : أ)  $x = 5k + 1$       ب)  $x = 5k$       ج)  $x = 5k + 4$
- (4) باقي القسمة الإقليدية للعدد  $(-2017)$  على 7 هو : أ) 1      ب) 6      ج)  $-6$
- (5) إذا كان باقي قسمة العدد الطبيعي  $a$  على 12 هو 8 فإن باقي قسمة  $a$  على 6 هو : أ) 0      ب) 1      ج) 2
- (6) إذا كان  $a \equiv 34[5]$  فإن : أ)  $a^{2017} \equiv -1[5]$       ب)  $a^{2017} \equiv 3[5]$       ج)  $a^{2017} \equiv 1[5]$

### التمرين الثاني: (6 نقط)

- $(U_n)$  متتالية عددية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية ب :  $U_0 = 5$  و  $U_{n+1} = 3U_n - 1$
- (1) أحسب الحدود  $U_1$  ،  $U_2$  و  $U_2$
  - (2) نعتبر المتتالية  $(V_n)$  المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية كمايلي :  $V_n = U_n - \frac{1}{2}$  .  
أ) أثبت أن  $(V_n)$  متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول  $V_0$   
ب) أكتب  $V_n$  بدلالة  $n$  .  
ج) أستنتج  $U_n$  بدلالة  $n$  ثم أحسب الحد الخامس للمتتالية  $(U_n)$  .  
د) أحسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$  ثم أستنتج المجموع  $S'_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

### التمرين الثالث: (8 نقط)

$f$  الدالة العددية المعرفة على  $]-\infty, -3[ \cup ]-3, +\infty[$  كما يلي  $f(x) = a - \frac{18}{x+3}$  حيث  $a$  عدد حقيقي

ليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) عين العدد  $a$  حتى تكون النقطة  $M(-2, -14)$  من المنحنى  $(C_f)$ .

(1) بين أنه  $a$  من أجل كل عدد حقيقي  $x \neq -3$  فإن :  $f(x) = \frac{4x-6}{x+3}$ .

(2) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم فسر بيانيا النتيجة.

(3) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  ثم فسر بيانيا النتيجة.

(4) أدرس اتجاه تغيرات الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

(5) عين نقط تقاطع المنحنى مع حاملتي المحورين.

(6) أكتب معادلة المماس  $(\Delta)$  عند النقطة ذات الفاصلة  $x_0 = 0$ .

(7) أنشئ  $(\Delta)$  و  $(C_f)$



## مناقشة الاختبار التجريبي في الميكالوريا

الموضوع الأول

التعريف الأول

(1) - تعيين باقي قسمة كل من  $b^2 + a^2$  و  $2axb$  على 11

لدينا  $a \equiv 3 [11]$  ومنه  $a^2 \equiv 9 [11]$  ... ①

$b \equiv 10 [11]$  ومنه  $b^2 \equiv 100 [11]$  ... ②

من ① و ② نجد:  $a^2 + b^2 \equiv 9 + 100 [11]$

أي  $a^2 + b^2 \equiv 109 [11]$

وبما أن  $109 \equiv 10 [11]$

فإن  $a^2 + b^2 \equiv 10 [11]$

بإبقاء قسمة  $a^2 + b^2$  على 11 هو 10 كما لدينا.

$a \equiv 3 [11]$  ومنه  $2a \equiv 6 [11]$  ... ①

$b \equiv 10 [11]$  ومنه ... ②

من ① و ② نجد  $2axb \equiv 60 [11]$

أي  $2axb \equiv 5 [11]$

بإبقاء قسمة  $2axb$  على 11 هو 5.

(2) التحقق من أن:  $b \equiv -1 [11]$

لدينا:  $b - (-1) = 10 + 1 = 11$

و 11 مضاف للعدد 11 ومنه

$b \equiv -1 [11]$

بإلا الاستنتاج

لدينا  $b \equiv -1 [11]$  أي  $b^{2017} \equiv (-1)^{2017} [11]$

ومنه  $b^{2017} \equiv -1 [11]$

أي  $b^{2017} \equiv 10 [11]$

بإبقاء قسمة  $b^{2017}$  على 11 هو 10

كما لدينا:  $b \equiv -1 [11]$  ومنه  $b^{1438} \equiv (-1)^{1438} [11]$

ومنه  $b^{1438} \equiv 1 [11]$

ومنه بإبقاء قسمة  $b^{1438}$  على 11 هو 1

3/ فبين أن A يقبل القسمة على 11.

لدينا:  $b \equiv -1 [11]$  ومنه  $b^{2n+1} \equiv (-1)^{2n+1} [11]$

أي  $b^{2n+1} \equiv -1 [11]$  ... ①

## السلسلة آداب وفلسفة / لغات أجنبية

ولدينا  $b \equiv -1 [11]$  ومنه  $b^{2n} \equiv (-1)^{2n} [11]$

أي:  $3b^{2n} \equiv 3 [11]$  ... ②

من ① و ② نجد  $b^{2n+1} + 3b^{2n} + 2 \equiv -1 + 3 + 2 \equiv 4 [11]$

$A \equiv 22 [11]$

$A \equiv 0 [11]$

ومنه A يقبل القسمة على 11.

4/ تعيين الأعداد الطبيعية n:

لدينا:  $(a+2b)^{2n} + 12n \equiv 0 [11]$

ومنه  $(3+2(-1))^{2n} + 12n \equiv 0 [11]$

$(3-2)^{2n} + 12n \equiv 0 [11]$

$1^{2n} + 12n \equiv 0 [11]$

أي  $1 + 12n \equiv 0 [11]$

ومنه:  $12n \equiv -1 [11]$

ومنه  $12n \equiv 10 [11]$

أي  $n = 11k + 10$  حيث k عدد طبيعي.

لما  $k=0$  نجد  $n = 11 \times 0 + 10 = 10$

لما  $k=1$  نجد  $n = 11 \times 1 + 10 = 21$

لما  $k=2$  نجد  $n = 11 \times 2 + 10 = 32$

لما  $k=3$  نجد  $n = 11 \times 3 + 10 = 43$

الأعداد الطبيعية هي 10, 21, 32, 43

## التعريف الثاني

(1) تعيين أساس المتتالية

لدينا:  $u_n = u_p + (n-p)r$

$u_n = u_2 + (n-2)r$

$u_n = 4 + (n-2)r$

$u_3 = 4 + (3-2)r = 4 + r$

$u_6 = 4 + (6-2)r = 4 + 4r$

ولدينا:  $u_6 - 2u_3 = 2$

ومنه  $4 + 4r - 2(4 + r) = 2$

$4 + 4r - 8 - 2r = 2$

$2r = 6$

$r = 3$

ولدينا:  $u_n = u_2 + nr$

من ①

$$-3x^2 = -3 \quad \text{أي}$$

$$x^2 = \frac{-3}{-3} = 1$$

ومنه  $x = -\sqrt{1}$  أو  $x = \sqrt{1}$

$x = -1$  أو  $x = 1$

إشارة  $f'(x)$  حسب الجدول التالي:

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	$-$

$f$  متناقصة تمامًا على  $[-\infty, -1]$  و  $[1, +\infty]$

و متزايدة تمامًا على  $[-1, 1]$   
حدها تغيرًا.

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-4$	$0$	$+\infty$

$$f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) - 2 = 1 - 3 - 2 = -4$$

$$f(1) = -1^3 + 3 \times 1 - 2 = -1 + 3 - 2 = 0$$

لدينا:  $f''(x) = -6x$

$f''(x) = 0$  ومنه  $-6x = 0$  أي  $x = 0$

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	$0$	$-$

$f''(x)$  تنعدم عند  $0$  وتغير إشارتها  
ومنه النقطة  $I(0, -2)$  نقطة انعطاف  
للنصف  $(C_f)$ .

4 - معادلة المماس (A):

$$y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$y = 3x - 2$$

- P-5  
لدينا:  
 $(x-1)(-x^2-x+2)$   
 $= -x^3 - x^2 + 2x + x^2 + x - 2$   
 $= -x^3 + 3x - 2$   
 $= f(x)$

(ب) حل المعادلة:

$$f(x) = 0$$

$$(x-1)(-x^2-x+2) = 0$$

$$\begin{cases} x-1=0 \\ \text{أو} \\ -x^2-x+2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=1 \\ -x^2-x+2=0 \end{cases}$$

$$\Delta = 9$$

تابع حل السلسلة التالفة:

$$u_n = u_0 + nr$$

$$u_2 = u_0 + 2 \times 3$$

$$u_0 = 4 - 6 = -2$$

2/ كتابة  $u_n$  بدلالة  $n$ :  $u_n = u_0 + nr$

$$u_n = -2 + 3n$$

3/ لدينا  $u_n = 100$  ومنه  $-2 + 3n = 100$

$$\text{أي } 3n = 102 \text{ أي } n = \frac{102}{3} = 34$$

$$\text{ومنه } \boxed{u_{34} = 100} \text{ رتبة 35}$$

4/ حساب المجموع:

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$= \frac{\text{عدد الحدود}}{2} (u_0 + u_n)$$

$$= \frac{n-0+1}{2} (-2 + 2 + 3n)$$

$$S_n = \frac{n+1}{2} (-4 + 3n)$$

ب- الجدول التالي:

$$T = u_0 + u_1 + \dots + u_{34}$$

$$= \frac{34+1}{2} (-4 + 3(34))$$

$$T = 1715$$

التقريب الثالث:

(1) من البيان  $g(1) = 0$

$$\text{ومنه } a - 3 \times 1^2 = 0 \text{ أي } a - 3 = 0$$

$$\text{ومنه } \boxed{a = 3}$$

2/ جدول تغير  $g$ :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$
$g(x)$	$-\infty$	$3$	$-\infty$

إشارة  $g(x)$ :

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$
$g(x)$		$-$	$+$	$-$

$$f(x) = -x^3 + 3x - 2 \quad \text{II}$$

1- حساب النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 3x - 2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + 3x - 2) = +\infty$$

2- إحياء تغير  $f$ :

$$f'(x) = -3x^2 + 3$$

$$-3x^2 + 3 = 0 \text{ ومنه } -3x^2 + 3 = 0$$

(من 2)

$$a \equiv -1 [5] \quad \text{أي} \\ \text{د منه } a^{2017} \equiv (-1)^{2017} [5] \\ \text{د منه } a^{2017} \equiv -1 [5]$$

التعريف الثاني .

$$u_1 = 3u_0 - 1 = 3 \times 5 - 1 = 14 \quad (1)$$

$$u_2 = 3u_1 - 1 = 3 \times 14 - 1 = 41$$

$$u_3 = 3u_2 - 1 = 3 \times 41 - 1 = 122$$

$$v_n = u_n - \frac{1}{2} \quad (2) \text{ نعتبر}$$

$$(P) \quad (v_n) \text{ متتالية هندسية معناه } \frac{v_{n+1}}{v_n} = q$$

لدينا

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{u_{n+1} - \frac{1}{2}}{u_n - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{3u_n - 1 - \frac{1}{2}}{u_n - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{3(u_n - \frac{1}{2})}{u_n - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 3$$

د منه  $(v_n)$  متتالية هندسية أساسها 3

و حدها الأول

$$v_0 = u_0 - \frac{1}{2} \\ v_0 = 5 - \frac{1}{2} = \frac{10-1}{2} = \frac{9}{2}$$

ب - عبارة  $v_n$  بدلالة  $n$ :

$$v_n = v_0 \times q^n$$

$$v_n = \frac{9}{2} \times 3^n$$

ج - لاستنتاج  $u_n$  بدلالة  $n$

$$v_n = u_n - \frac{1}{2} \quad \text{لدينا:}$$

$$v_n + \frac{1}{2} = u_n \quad \text{د منه:}$$

$$u_n = \frac{9}{2} \times 3^n + \frac{1}{2} \quad \text{أي}$$

$$u_n = \frac{9}{2} \times 3^n + \frac{1}{2} \quad \text{الحده الخامس هو:}$$

$$u_4 = 365$$

$$S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n \quad - 5$$

$$= \frac{\text{عدد الحدود}}{1-q} (1 - q^n)$$

$$= \frac{\frac{9}{2}}{1-3} (1 - 3^{n-0+1}) = \frac{-9}{4} (1 - 3^{n+1})$$

هو 3

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$


$$= \frac{1+3}{-2} = -2$$

$$x_1 = \frac{1-3}{-2} = 1$$

المنحنى  $(C_f)$  يقطع حامل محور الفواصل في

النقطتين  $M_2(-2, 0)$  ,  $M_1(1, 0)$

رسم المنحنى:



الموضوع الثاني

التعريف الأول :

1 - الاقتراح الصحيح هو : (ب)

$$\text{لدينا: } 9720 = 2^3 \times 3^5 \times 5^1$$

عدد قواسم 9720

$$(3+1)(5+1)(1+1) = 4 \times 6 \times 2 = 48$$

2 - الاقتراح الصحيح هو : (ب)

$$\text{لدينا } 2016 - 1436 = 580$$

و 580 مضاعف للعدد 5 وليس مضاعف للعدد 7 و 9 .

3 - الاقتراح الصحيح هو : (ج)

$$\text{لدينا } x+2 \equiv 1 [5] \text{ د منه } x \equiv -1 [5]$$

$$x \equiv 4 [5] \quad \text{أي}$$

$$\text{د منه } x = 5k + 4 \text{ حيث } k \in \mathbb{Z}$$

4 - الاقتراح الصحيح هو : (ب)

$$\text{لدينا } \begin{cases} -2017 = 7(-289) + 6 \\ 0 \leq 6 < 7 \end{cases}$$

د منه باقي القسمة الإقليدية للعدد 2017 على 7 هو 6

5 - الاقتراح الصحيح هو : (أ)

$$\text{لدينا: } a \equiv 34 [5]$$

$$a \equiv 4 [5] \quad \text{د منه}$$



$$f'(x) = \frac{(4x-6)'(x+3) - (x+3)'(4x-6)}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{4(x+3) - (4x-6)}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{4x+12-4x+6}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{18}{(x+3)^2} > 0$$

f متزايدة تماماً على المجالين  $]-\infty, -3[$  و  $]3, +\infty[$ .

جدول التفرع:

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
f'(x)			
f(x)			

5 - نقط التقاطع مع المحاور:

مع محور الفواصل:  $f(x) = 0$

$4x-6=0 \Rightarrow x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$  أي  $M(\frac{3}{2}, 0)$  نقطة تقاطع محور الفواصل في النقطة  $M(\frac{3}{2}, 0)$  مع محور الترتيب:

$f(0) = \frac{-6}{3} = -2$

(Cf) يتقاطع مع محور الترتيب في النقطة  $M'(0, -2)$


6 - معادلة المماس:

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$y = \frac{18}{(0+3)^2} x - 2$

$y = 2x - 2$

رسم المماس والمماس:



ص 4

$$S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$= (v_0 + \frac{1}{2}) + (v_1 + \frac{1}{2}) + \dots + (v_n + \frac{1}{2})$$

$$= (v_0 + v_1 + \dots + v_n) + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2})$$

$$= S_n + \text{عدد الحدود} \times \frac{1}{2}$$

$$S'_n = -\frac{3}{4}(1-3^{n+1}) + (n+1) \times \frac{1}{2}$$

التمرين الثالث

(P/1)  $f(x) = a - \frac{18}{x+3}$

لدينا  $M(-2, -14)$  نقطة من (Cf)

معناه  $f(-2) = -14$

أي  $a - \frac{18}{-2+3} = -14$

أي  $a - 18 = -14$

$a = -14 + 18$

ومنه  $a = 4$  إذن  $f(x) = 4 - \frac{18}{x+3}$

(P/4) التبيين:

لدينا:  $f(x) = 4 - \frac{18}{x+3}$

$= \frac{4(x+3) - 18}{x+3}$

$f(x) = \frac{4x+12-18}{x+3}$

$f(x) = \frac{4x-6}{x+3}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{x} = 4$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{x} = 4$

التفسير البياني: (Cf) يقبل مستقيم مقارب موازي لخط محور الفواصل معادلة  $y = 4$

-3  $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{4x-6}{x+3} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{4x-6}{x+3} = -\infty$

التفسير البياني: (Cf) يقبل مستقيم مقارب موازي لخط محور الترتيب معادلة  $x = -3$