

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية العقيد احمد بن عبد الرزاق  
دورة \_\_\_\_\_ اي 2019  
الشعبة: رياضيات  
المدة: 04 ساعات ونصف

مديرية التربية لولاية وهران  
امتحان البكالوريا التجاري  
المستوى: سنتـة ثـالثـة  
اختبار في مادة: الرياضيات

## على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين: الموضوع الأول

### التمرين الأول: (04.5 نقاط)

المستوى المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتبعانس  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $(E_\theta) : z^2 + 4z\cos\theta + 4 = 0$  حيث  $\theta \in [0, \pi]$ .

1) أثبت أنه إذا كان  $\alpha$  حل للمعادلة  $(E_\theta)$  فإن  $\bar{\alpha}$  هو كذلك حل لها.

2) نضع:  $z_1 = -2\cos\theta - 2i\sin\theta$  و  $z_2 = -2\cos\theta + 2i\sin\theta$ .

أتحقق أن  $z_1$  و  $z_2$  هما حلول للمعادلة  $(E_\theta)$ .

بأكتب  $z_1$ ,  $z_2$  و  $\frac{z_1}{z_2}$  على الشكل الأسني.

ج- استنتج قيمة  $\theta$  التي من أجلها يكون  $OM_1M_2$  مثلثاً قائماً في  $O$  حيث  $M_1$  و  $M_2$  نقطتان من المستوى لواحقهما  $z_1$  و  $z_2$  على الترتيب.

3) عين  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوى ذات اللاحقة  $z$  لما  $\theta$  تمسح المجال  $[-\pi; \pi]$  و  $k$  يمسح المجال  $[0; 2]$  حيث:  $z = ke^{i\theta} + 3$ .

4) نعتبر  $\theta \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$  والنقط  $A, B, C$  لواحقها على الترتيب  $z_1, z_2$  و  $z$ .

أتحقق أن  $\frac{z_2 - 2}{z_1 - 2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$  واستنتاج طبيعة المثلث  $ABC$ .

ب- عين مركز ونصف قطر الدائرة  $(\Phi)$  المحيطة بالمثلث  $ABC$ .

5) نعتبر التحويل النقطي  $S$  في المستوى الذي يرافق بكل نقطة  $(z)$  النقطة  $(z')$  حيث:  $z' = iz + 3$ .

أ- عين طبيعة التحويل  $S$  وعنصره المميز.

ب- عين  $(\Phi)$  صورة الدائرة  $(\Phi)$  بالتحويل  $S$  ماذا تستنتج؟

### التمرين الثاني : (04 نقاط)



إناءان  $u_1$  و  $u_2$  حيث  $u_1$  يحتوي على ثلاثة كرات بيضاء وكرتان سوداء و  $u_2$  يحتوي على كرتان بيضاوان وثلاث كرات سوداء. نسحب كرتان دفعة واحدة من كل منها علما أن الكرات متجانسة في اللمس، فتحصل بذلك على أربع كرات.

1. نهتم بعدد الكرات البيضاء المسحوبة من الإناء  $u_1$  وعد الكرات البيضاء المسحوبة من الإناء  $u_2$ .

• بين أن احتمال سحب كرتين بيضاوين من الإناء  $u_1$  هو  $p_1 = 0,3$  و من الإناء  $u_2$  هو  $p_2' = 0,1$ .

• شكل الشجرة المثلثة المناسبة.

• برهن أن احتمال الحادثة  $E$  "ضمن الكرات المسحوبة يوجد بالضبط كرتان بيضاوان" هو: 0,46.

2. ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرافق بكل عملية سحب عدد الكرات البيضاء المحصل عليها.

أ- حدد قانون الاحتمال  $X$ .

ب- اللاعب يدفع 2,50DA قبل إجراء السحب. ويكسب 1DA لكل كرة بيضاء مسحوبة. هل اللعبة مربحة له؟

3. احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء فقط من الإناء  $u_2$  علما أنه حصل على كرتين بيضاوين.

### التمرين الثالث : (04.5 نقاط)

.  $U_{n+2} = 5U_{n+1} - 4U_n$  ،  $U_1 = 1$  ،  $U_0 = 0$  ، ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

1- احسب  $U_2$  و  $U_3$ .

2- برهن بالرجوع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أن:  $U_{n+1} = 4U_n + 1$

- تحقق أن:  $U_n$  عدد طبيعي، ثم استنتج أن:  $U_n$  و  $U_{n+1}$  أوليان بينهما.

$$\cdot V_n = U_n + \frac{1}{3} \quad 3$$

- بين أن المتتالية  $(V_n)$  هندسية، عين أساسها وحدتها الأولى، ثم اكتب  $V_n$  و  $U_n$  بدلالة  $n$ .

$$4\text{ أ) احسب } PGCD(4^6 - 1, 4^5 - 1)$$

$$4\text{ ب) عين من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ : } PGCD(4^{n+1} - 1, 4^n - 1)$$

5 أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة  $4^n$  على 7.

ب) احسب بدلالة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث:  $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{3n}$ .

ج) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  حيث العدد  $9S_n + 4^n$  يقبل القسمة على 7.

### التمرين الرابع : (07 نقاط)

الفروع الأولى :

1| نعتبر الدالة  $g_n$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $g_n(x) = n(x+1) + e^x$  حيث  $n$  عدد طبيعي غير معروف

أـ أدرس تغيرات الدالة  $g_n$  وأكتب جدول تغيراتها.

بـ برهن أن المعادلة  $g_n(x) = 0$  تقبل على  $\mathbb{R}$  حلًا وحيدا  $\alpha_n$  ثم تتحقق أن  $-2 < \alpha_n < -1$ .

جـ استنتاج حسب قيم  $x$  إشارة  $g_n(x)$

2| نعتبر الدالة  $f_n$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  حيث:  $f_n(x) = \frac{x e^x}{n + e^x}$  وهي منحنيها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد والمتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

أـ أحسب:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_n(x) - x]$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$  و فسر النتائج بيانيا

$$f_n'(x) = \frac{e^x \cdot g_n(n)}{(n + e^x)^2}$$

جـ بين أن:  $f_n(\alpha_n) = 1 + \alpha_n$  ثم أكتب جدول تغيرات الدالة  $f_n$

3| أـ أدرس وضعية المنحني  $(C_n)$  بالنسبة للمستقيم  $(D)$  الذي معادلته:  $y = x$

بـ أدرس وضعية المنحنيين  $(C_n)$  و  $(C_{n+1})$  ثم أنشئ المنحنيين  $(C_1)$  و  $(C_2)$

الفروع الثانية :

نعتبر التكاملين:  $U_n = \int_{-1}^0 f_n(x) dx$  و  $I = \int_{-1}^0 x e^x dx$

1| أحسب:  $I$  ثم برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[-1, 0]$  :

2| بين أن المتتالية  $(U_n)$  متقاربة و حدد نهايتها

$$V_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$A \int_{k+1}^{k+2} \frac{1}{t} dt \leq \frac{1}{k+1} : k$$

$$B \frac{1}{1+1} + \frac{1}{2+1} + \frac{1}{3+1} + \dots + \frac{1}{n+1} \geq \ln(n+2) - \ln 2$$

جـ برهن إذن أن:  $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = -\infty$

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (04 نقاط)

- 1) بين أن المعادلة  $(E)$  تقبل حلولاً في  $\mathbb{Z}^2$ ، ثم استنتج أن المعادلة  $(E)$  تكافئ المعادلة  $673x - 480y = 1059$ .

2) أجد حللاً خاصاً  $(x_0; y_0)$  للالمعادلة  $(E)$  حيث:  $x_0^2 + 480y_0 = 969$  مع  $x_0 \geq 0$ .

بـ حل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة  $(E)$ .

3) عين قيم العدد الصحيح  $\lambda$  التي تتحقق الجملة  $(S)$  حيث

- . II. 1. أـ. ادرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة  $3^n$  و  $5^n$  على 7 .

جـ. عين قيم العدد الطبيعي  $n$  التي تتحقق :  $3 \times 2019^n - 2 \times 1440^n + 2020^{2019} \equiv 0 [7]$

$N = \overline{1...110}$  عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 5 كما يلي: 2018 fois

-**٧- بين أن العدد الطبيعي  $N - 5$  مضاعف للعدد ٧.**

## التمرين الثاني : (04.5 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  كثير الحدود  $P(z)$  حيث:  $P(z) = z^3 - 7z^2 + 25z - 39$

- $$P(z) = (z - 3)(z^2 + \alpha z + \beta) \text{ حيث من أجل كل عدد مركب } z, P(z) = 0 \text{ يوجد في } \mathbb{C} \text{ مجموعتا حلول المعادلة:}$$

فـ المستوى الـ كـب المـسـعـب الـ مـعـلـم مـتـعـامـد و مـتـحـانـس

2) في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(o; \vec{i}; \vec{j})$ . نعتبر النقط  $A, B, C$  و  $D$  ذات اللوحة :

$$z_D = -1 - 2i \quad , \quad z_C = 2 - 3i \quad , \quad z_B = 3$$

– احسب العدد  $\frac{z_c - z_b}{z_a - z_b}$  ثم استنتج نوع المثلث

- (3) ليكن التحويل النقطي  $S$  الذي يحول النقطة  $(z)$  إلى النقطة  $(z')$  حيث:  $z' = (1-i)z + b$

أ—عين العدد المركب  $b$  حتى تكون النقطة  $A$  مركز التحويل النقطي  $S$

بـ\_ ما طبيعة التحويل ؟ مبينا عناصره المميزة.

- (4) ليكن  $A_{n+1} = S(A_n)$  :  $n$  عدد طبيعي كل لاحقة  $A_0$  و  $z_n$  من أجل  $i=1$  لاحقة النقطة  $A_0$

$$z_n = (1-i)^n + i : n$$

**بـ-نعرف المتالية  $(u_n)$  على  $\mathbb{N}$  بـ:**  $u_n = |z_{n+1} - z_n|$  ثم جد عبارة الحد العام  $u_n$  بدلالة  $n$

استنتج أنها هندسية أساسها  $\sqrt{2}$  ، ثم أحسب الطول:  $A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_{19}A_{20}$

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $O(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  النقط  $A(3,2,1)$  و  $B(4,3,2)$  و  $C(3,1,-1)$  و  $E(-1,3,1)$

و نعتبر المستقيم  $(\Delta)$  الموجه بالشعاع  $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$  و يشمل النقطة  $E$

١) بين أن المستقيمين  $(\Delta)$  و  $(AB)$  غير متوازيين

2) أكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم  $(AB)$  و استنتج ان النقط  $C, B, A$  ليست في إستقامية

(3) أ- برهن ان المعادلة الديكارتية للمستوى  $(ABC)$  هي :

بـ- استنتج ان المستقيم  $(\Delta)$  غير محتوى في المستوى  $(ABC)$

( ) ४३ - ५३ ३५ ( ) १२ १०८

جـ. نعتبر النقطة  $M_t \in (ABC)$  حيث  $t \in \mathbb{R}$  (جـ. قيم العدد الحقيقي  $t$  بحيث يكون  $M_t = \left(\frac{1}{2}, \sin t \times \cos t, 0\right)$ )

(4) أـ. أكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم  $(\Delta)$  و استنتج إحداثيات النقطة  $H$  نقطة تقاطع  $(\Delta)$  و  $(ABC)$

بـ. استنتاج أن  $(\Delta)$  و  $(AB)$  ليسا من نفس المستوى

(5) نعتبر  $(P_m)$  مجموعة النقط  $M(x, y, z)$  من الفضاء التي تتحقق:  $(m-1)x + (2m-6)y + (3-m)z + m - 2 = 0$


أـ. برهن أنه لأجل كل عدد حقيقي  $m$  المجموعة  $(P_m)$  هي مستوى، ثم برهن أن المستوي  $(P_m)$  ينتمي إلى المستويات

بـ. برهن أن المستويات  $(P_m)$  تشمل مستقيماً تابتاً  $(D)$  يطلب تعين نقطة منه و شاعر توجيهه

#### التمرين الرابع : (7 نقاط)

I. الدالة العددية المعرفة على المجال  $[0; +\infty)$  هي  $g(x) = 2x \ln x - x - 1$ .

المنحنى  $(C_g)$  المقابل هو التمثيل البياني للدالة  $g$  في مستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .



المنحنى  $(C_g)$  يقبل مماساً موازياً لمحور الفواصل عند النقطة التي فاصلتها  $\frac{1}{\sqrt{e}}$  و  $(\Delta)$  هو المماس له  $(C_g)$  في النقطة التي فاصلتها  $1 = x$ .

❶ بقراءة بيانية: أـ. حدد  $g'(1)$ ;  $g'(1)$  ثم عين معادلة للمماس  $(\Delta)$ .

بـ. شكل جدول تغيرات الدالة  $g$ .

❷ أـ. علل وجود عدد حقيقي  $\alpha$  حيث  $2 < \alpha < 1$  و يتحقق  $g(\alpha) = 0$ .  
بـ. استنتاج إشارة  $(x)$  على المجال  $[0; +\infty)$ .

II. دالة معرفة على المجال  $[0; +\infty)$  هي  $f(x) = \begin{cases} x^2(\ln x - 1) - x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ .

❸ تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .  
أـ. بين أن الدالة  $f$  مستمرة عند الصفر من اليمين.

بـ. بين أن:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -1$ , ماذا يمكن أن تستنتج؟

جـ. أكتب معادلة نصف المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة  $O$  من اليمين.

❹ أـ. احسب  $f'(x) = g(x)$ , بـ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x > 0$ ,  $f'(x) = g(x)$ .  
جـ. شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

❺ بين أن:  $f(\alpha) = -\left(\frac{\alpha^2 + \alpha}{2}\right)$ .

❻ ليكن  $(D)$  المماس الذي معادلته  $y = -x$ .

أـ. ادرس الوضعيّة النسبية بين  $(C_f)$  و  $(D)$ . بـ. انشئ  $(D)$  و  $(C_f)$ . نأخذ  $0 \approx 3.55$ .

❽ دالة معرفة على المجال  $[0; +\infty)$  هي  $F(x) = \frac{x^3}{9}(3 \ln x - 4)$ .

أـ. احسب  $F'(x)$ , ثم استنتاج دالة أصلية للدالة  $F$  على المجال  $[0; +\infty)$ .

بـ. هي مساحة العجز المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيم  $(D)$  والذين معادلتاهما  $x = e$  و  $x = 1$ .

بـ. بين أن:  $A = \frac{e^3 - 4}{9} u.a$  بعد تمثيلها على الرسم. (يرمز  $u.a$  إلى وحدة المساحة).

انتهى الموضوع الثاني

© استاذ المادة يتمنى لكم النجاح في شهادة البكالوريا