

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

### الموضوع الأول

التمرين الأول:

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  النقط  $A(1;3;2)$  ،  $B(1;-1;0)$  و  $C(2;0;1)$ .

1- أ) بين أن النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  تعين مستويا.

ج) بين أن  $x + y - 2z = 0$  معادلة ديكرتية للمستوي  $(ABC)$ .

2-  $(P)$  المستوي الذي معادلته  $x - 2y - 2z + 6 = 0$ .

أ) بين أن المستويان  $(ABC)$  و  $(P)$  متقاطعان وفق مستقيم وليكن  $(\Delta)$ .

ب) بين أن الجملة  $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases}$  حيث  $(t \in \mathbb{R})$  تمثيل وسيطي للمستقيم  $(\Delta)$ .

3- بين  $O$  مرجح الجملة  $\{(A;1);(B;3);(C;-2)\}$

4- أ- عين طبيعة  $(S)$  مجموعة النقط  $M$  من الفضاء التي تحقق  $\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{5}$

ب- احسب احداثيات النقطتين  $D$  و  $E$  تقاطع  $(S)$  و  $(\Delta)$ .

ج- ما هي طبيعة المثلث  $ODE$ ؟ استنتج المسافة بين  $O$  و  $(\Delta)$ .

التمرين الثاني:

1- حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(z - 3)(z^2 + 4z + 8) = 0$ .

2- المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، لتكن النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  التي لواحقها على

الترتيب:  $z_A = 3$  ،  $z_B = -2 + 2i$  و  $z_C = -2 - 2i$

أ- احسب الأطوال  $AB$  ،  $AC$  و  $BC$  ثم استنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

ب- عين  $z_D$  لاحقة النقطة  $D$  مرجح الجملة  $\{(A;1);(B;-1);(C;1)\}$

ت- حدد مع التبرير طبيعة الرباعي  $ABCD$ .

3- لتكن النقطة  $M$  من المستوي ذات اللاحقة  $z$ ، حيث  $M$  تختلف عن النقطتين  $A$  و  $B$ .

أ- فسر هندسيا عمدة العدد المركب  $\frac{z-3}{z+2-2i}$ .

ب- عين مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  التي تجعل  $\frac{z-3}{z+2-2i}$  عددا حقيقيا موجبا تمام

## التمرين الثالث:

### الجزء 1:

نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $g(x) = 2x^2 - \ln x$

1- احسب نهايتي الدالة  $g$  عند  $+\infty$  وعند  $0$ .

2- ادرس اتجاه تغيرات الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها.

3- استنتج إشارة  $g(x)$  على المجال  $]0; +\infty[$ .

### الجزء 2:

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = 2x - 1 + \frac{1 + \ln x}{x}$

وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1- عين نهاية الدالة  $f$  بجوار  $0$  و  $+\infty$ .

2- ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3- أثبت أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = 2x - 1$  مستقيم مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

4- تحقق أن المستقيم  $(\Delta)$  يقطع المنحنى  $(C_f)$  في نقطة  $A$  يطلب تعيين إحداثياتها.

5- حدد وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$  في المجال  $]0; +\infty[$ .

6- أثبت أنه توجد نقطة وحيدة  $B$  للمنحنى  $(C_f)$  يكون المماس  $(T)$  عندها موازي للمستقيم  $(\Delta)$

يطلب كتابة معادلة  $(T)$

7- برهن أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث:  $0,39 < \alpha < 0,40$ .

8- ارسم  $(C_f)$  و  $(\Delta)$  و  $(T)$  ثم  $(C_f)$  ( $\|\vec{i}\| = 2cm$  ;  $\|\vec{j}\| = 1cm$ )

9- ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة  $(m+1)x - 1 - \ln x = 0$

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول:

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

$$(\Delta): \begin{cases} x = 1+t \\ y = -1-2t \\ z = -1+t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}) \text{ حيث: } (\Delta) \text{ والمستقيم } A(2; -4; 1)$$

- 1- عين معادلة المستوي  $(P)$  الذي يشمل النقطة  $A$  والمستقيم  $(\Delta)$ .
- 2- عين إحداثيات النقطة  $C$  من  $(\Delta)$  بحيث يكون  $(AC) \perp (\Delta)$ .
- 3- تحقق أن النقطة  $B(2; -3; 0)$  نقطة من  $(\Delta)$  ثم استنتج مساحة المثلث  $ABC$ .
- 4- أحسب المسافة بين النقطة  $D(0; 0; 2)$  والمستوي  $(P)$ ، ثم استنتج حجم رباعي الوجوه  $ABCD$ .
- 5- استنتج وضعية المستقيم  $(\Delta)$  مع  $(AD)$ .

### التمرين الثاني:

1- نعتبر العددين المركبين  $z_1 = 3+2i$  و  $z_2 = 1-2i$

أ- بين أن  $z_1 + \overline{z_2} = 4(1+i)$

ب- أكتب  $z_1 + \overline{z_2}$  على الشكل المثلثي.

ج- عين قيم العدد الطبيعي  $n$  التي يكون من أجلها  $(z_1 + \overline{z_2})^n$  عدد تخلياً صرفاً.

2- في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقط  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$

التي لواحقتها  $z_A = 3+2i$ ،  $z_B = -3$ ،  $z_C = 1-2i$  و  $z_D = -1-6i$  على الترتيب.

أ- عين الطويلة وعمدة للعدد المركب  $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

ب-  $G$  مرجح الجملة  $\{(A;1); (B;-1); (D;1)\}$ .

- عين  $z_G$  لاحقة النقطة  $G$ ، ثم بين ان الرباعي  $ABDG$  مربع.

ج-  $(F)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوي التي تحقق  $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}\| = 4\sqrt{5}$ .

- بين أن النقطة  $B$  تنتمي إلى  $(F)$ .

- عين  $(F)$  ثم أنشئها.

### التمرين الثالث:

#### الجزء 1:

نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $]-\infty; 2]$  كما يلي:  $g(x) = x + 1 + e^x$

- 1- أحسب نهاية الدالة  $g$  عند  $-\infty$ .
- 2- ادرس اتجاه تغيرات الدالة  $g$  وشكل جدول تغيراتها على  $]-\infty; 2]$ .
- 3- بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حل وحيد  $\alpha$  حيث:  $-1,28 < \alpha < -1,27$ .
- 4- استنتج إشارة  $g(x)$  على  $]-\infty; 2]$ .

#### الجزء 2:

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]-\infty; 0[ \cup ]0; 2]$  كما يلي:  $f(x) = x - 1 + \frac{1+e^x}{x}$

وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- 1- عين نهاية الدالة  $f$  بجوار  $0$  و  $-\infty$ .
- 2- بين أن  $f'(x) = \frac{(x-1)g(x)}{x^2}$  ثم استنتج إشارة  $f'(x)$  على  $]-\infty; 0[ \cup ]0; 2]$ .
- 3- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.
- 4- احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x-1)]$  ثم فسر النتيجة هندسيا.
- 5- ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = x - 1$ .
- 6- بين أن  $f(\alpha) = \alpha - 2$  ثم استنتج حصر للعدد  $f(\alpha)$ .
- 7- ارسم  $(\Delta)$  ثم  $(C_f)$  ( $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1cm$ ).
- 8- ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة  $x^2 - (1+m)x + 1 + e^{-x} = 0$

#### الجزء 3:

لتكن  $h$  الدالة المعرفة على المجال  $]-\infty; 0[$  كما يلي:  $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$

- 1- بين أن  $f'\left(\frac{1}{x}\right) > 0$  على المجال  $]\frac{1}{\alpha}; 0[$  و  $f'\left(\frac{1}{x}\right) < 0$  على المجال  $]-\infty; \frac{1}{\alpha}[$ .
- 2- باستعمال مشتقة دالة مركبة أحسب  $h'(x)$  بدلالة  $f'(x)$ .
- 3- احسب  $h'\left(\frac{1}{\alpha}\right)$  ثم استنتج إشارة  $h'(x)$  على المجال  $]-\infty; 0[$  ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $h$ .