

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع الأول

التمرين الأول (04,5 نقاط) :

$$f(z) = z^3 - (2+i)z^2 + 2(2+i)z - 4i \quad f(z) \text{ كثير حدود للمتغير المركب } z:$$

1. تحقق أن $f(i) = 0$. ثم أوجد العددان الحقيقيين a و b حيث: $f(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$

2. أ. حل في \mathbb{C} مجموعة الأعداد المركبة المعادلة: $0 = f(z)$ و اكتب الحلول z_1 ، z_2 و i على

الشكل الأسني. علماً أن: $\operatorname{Im}(z_1) > 0$

$$\left(\frac{z_1}{z_2} \right)^{2017} \quad \text{ب. أكتب على الشكل الجبري العدد المركب}$$

3. في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$

لتكن النقط: A ، B و C لواحقها على الترتيب: i ، $1 + i\sqrt{3}$ ، $1 - i\sqrt{3}$.

أ) عين z_G لاحقة النقطة G مررج الجملة: $\{(A, 1), (B, 1), (C, -3)\}$

ب) عين مجموعة النقط M والتي تتحقق: $\left| \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} - 2 \cdot \overrightarrow{CM} \right| = \left| \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} - 3 \cdot \overrightarrow{CM} \right|$

4. تحويل نقطي يرفق بكل نقطة M النقطة M' حيث: $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} - 3 \cdot \overrightarrow{CM}$ بين أن h تحاك يطلب تعين مركزه و نسبته.

التمرين الثاني (05 نقاط) :

أ) معلم متعامد ومتجانس في الفضاء، لتكن النقط $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

1. أ. بين أن المثلث ABC متقارن الساقين، أوجد إحداثيات النقطة I منتصف $[AB]$. ثم أحسب S مساحة المثلث ABC .

ب. عين العددان الحقيقيين a و b حيث: $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \end{pmatrix}$ شاعر ناظمي للمستوى (ABC) ، استنتج معادلة ديكارتية له.

2. لتكن النقطة $D(-1; 1; -1)$. أحسب بُعد النقطة D عن المستوى (ABC) . ثم أحسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

3. ليكن المستوى (P) ذي المعادلة: $x + 2y - z + 3 = 0$. تتحقق أن (P) و (ABC) متعامدان . ثم أوجد تمثيلا وسيطياً للمستقيم (d) تقاطع المستويين (P) و (ABC) .

4. (Q) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء وتحقق: $(2x + y - 2z + 1)^2 - (3y + 5)^2 = 0$

و (E) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء وتحقق: $(2x + y - 2z + 1)^2 + (3y + 5)^2 = 0$ حدد طبيعة و عناصر المجموعتين (E) و (Q).

التمرين الثالث (03 نقاط):

1. لتكن المتالية الحسابية (v_n) المعرفة في \mathbb{N}^* بالدين : $v_8 = 15$ ، $v_2 = 3$.
 أ. عين أساس المتالية (v_n) وحدها الأول v_1 ثم عبارة الحد العام v_n بدلالة n . حدد اتجاه تغيراتها.
 ب. بين وجود ستة حدود متعاقبة من المتالية (v_n) مجموعها يساوي 2016، عين الحد الأول منها.

2. لتكن المتالية العددية (u_n) المعرفة في \mathbb{N}^* بحدها العام $u_n = 2n - 1 - \ln\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)$:

$$u_n = v_n - \ln\left(\frac{v_n}{v_{n+1}}\right)$$

أ. تحقق أن:

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots + w_n = -\ln(2n+1) \quad \text{بين أن: } w_n = \ln\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)$$

ب. نضع:

3. باستعمال النتائج السابقة أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$

التمرين الرابع (07 نقاط):

لتكن f الدالة المعرفة على $I = [1; +\infty]$ حيث:

(C_f) المنحنى الممثل لها في مستوى مزود بمعلم متعمد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

أ. أحسب نهاية الدالة f عند 1 . فسر النتيجة هندسيا.

ب. أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$. بين أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (d) معادلته: $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (d) .

ت. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من I ثم أدرس إشارة $f'(x)$ على I وشكل جدول تغيراتها.

2. أ. لتكن g الدالة المعرفة على I حيث: $x - g(x) = f(x)$. بين أن الدالة g متناظرة على I .

ب. بين أن المعادلة : $x = f(x)$ تقبل حلاً وحيداً α محصوراً بين 2 و $\frac{5}{2}$

ج. أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f) .

3. أ. بين أن الدالة H حيث: $H(x) = (x+1) \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - 2 \ln(x-1)$ أصلية للدالة h على المجال I

حيث : $h(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ ب. أحسب مساحة الحيز المحصور بين المنحنى (C_f) و (d) والمستقيمين

الذين معادلتهما: $x = 4$ ، $x = 2$

4. لتكن المتالية العددية (v_n) المعرفة بحدها الأول $v_0 = 6$ وبالعلاقة التراجعية: $v_{n+1} = f(v_n)$

أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n > \alpha$ ، α العدد المعرف في السؤال (2) (ب)

ب. بين أن المتالية (v_n) متناظرة ، استنتج أنها متقابلة ، حدد نهايتها.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (4,5 نقاط)

($O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) معلم متعمد متجانس في الفضاء، (d_1), (d_2) مستقيمان معرفان بتمثيليهما الوسيطين التاليين:

$$(d_2) : \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 - t' \\ z = 4 + 2t' \end{cases} \quad t' \in R ; \quad (d_1) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad t \in R ;$$

1. أ. عين إحداثيات النقطة B تقاطع المستقيمين (d_1) و (d_2).


ب. عين تمثيلاً وسيطياً للمستوي (P) المعيّن بالمستقيمين (d_2) و (d_1).

2. أ. بين أن النقطة $A(6; 4; 4)$ لا تتنمي إلى المستوي (P).

ب. بين أن النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P).

3. عين معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يشمل النقطة A و $(-7; 5; 1)$ شاعر ناظمي له.

4. عين إحداثيات C و D نقطتي تقاطع (Q) مع كل من (d_1) و (d_2) على الترتيب. عين طبيعة المثلث BCD .



التمرين الثاني (4,5 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[1, +\infty)$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعمد والمتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$). الشكل المقابل

1. بين أن الدالة f متزايدة على المجال $[1, +\infty)$.

2. لتكن المتالية العددية (u_n) المعرفة في \mathbb{N} بحدتها

الأول $u_0=6$ وبالعلاقة التراجعية $f(u_n) = u_{n+1}$ من أجل كل عدد طبيعي n .

أ. أنقل المنحني المقابل ثم مثل الحدود الأربع الأولي للمتالية (u_n) على حامل محور الفواصل دون حسابها موضحا خطوط الإنشاء.

ب. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \leq 6$: $u_n \leq 1$. ثم أدرس اتجاه تغير المتالية (u_n) . وبين أنها متقاربة.

3. نعتبر المتاليتين (w_n) ; (v_n) المعرفتين على \mathbb{N} :

أ. أحسب w_0 ، وبين أن المتالية (w_n) هندسية أساسها 2. أكتب w_n بدالة n ، ثم عبارة v_n بدالة n .

ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$ ثم أحسب نهاية المتالية (u_n) .

4. أحسب بدالة n المجموع: $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$. ثم أستنتج الجداء: $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$ بدالة n .

التمرين الثالث (04 نقاط) :

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. ولتكن النقط A ، B و C التي لواحقها على

$$\text{الترتيب: } z_C = 1 + \sqrt{2}i, z_A = 1 - i \text{ و } z_B = 1 + i$$

1. أ. أكتب z_A ، z_B على الشكل الأسني.

ب. بين أن : $\arg(z_A) + 2\arg(z_C) = 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$ ثم استنتج أن:

جد عدمة $-z_C$ ثم أكتب z على الشكل الأسني.

2. S التشابه المباشر الذي مركزه B والذي يحول النقطة C إلى النقطة A . عين نسبة و زاوية التشابه. ثم استنتاج طبيعة المثلث ABC .

3. أ. لتكن (E) مجموعة النقط M لاحتها z تتحقق: $2 = (z - z_A)(\bar{z} - z_B)$

عين طبيعة وعناصر المجموعة (E) . (لاحظ أن: $z_B = \bar{z}_A$)

ب. عين المجموعة (E') صورة (E) بالتحويل S .

التمرين الرابع (07 نقاط) :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$

أ. تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعمد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الوحدة: $2cm$.

1. أ. أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$. فسر النتائج هندسيا.

ب. أحسب عبارة $(x)' f$ ثم استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، شكل جدول تغيراتها.

ج. أحسب $(1)f$ ثم عين إحداثيات نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل ، أنشئ (C_f)

2. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = f(m)$.

3. أ. عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة F المعرفة كما يلي : $F(x) = (ax + b)e^{2x}$ دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} .

ب. أحسب $S(a)$ مساحة الحيز المحدد بـ: المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$$x = \alpha \text{ و } x = \frac{1}{2} \text{ حيث: } \alpha < \frac{1}{2}. \text{ أحسب نهاية } S(a) \text{ لما } \alpha \text{ تؤول إلى } -\infty.$$

4. لتكن المعادلة التفاضلية : $(1) \dots 2y - y' = 2e^{2x}$

أ. تحقق أن : الدالة f حل للمعادلة (1) .

ب. بين أن: $(f+g)$ حل للمعادلة (1) إذا وفقط إذا كان g حل للمعادلة : $(2) \dots 2y - y' = 0$

حل المعادلة (2) ثم استنتاج حلول المعادلة (1) .

5. نرمز بـ: $f^{(n)}$ المشقة من الرتبة n للدالة f حيث: n عدد طبيعي غير معدوم

أ. برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n من \mathbb{N}^* :

ب. استنتاج دالة أصلية للدالة u على \mathbb{R} : $u(x) = (-2017 - 2x)e^{2x}$