

المدة : 3 ساعات ونصف سا	اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات	القسم : 3 ع تجريبية
-------------------------	---------------------------------------	---------------------

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول (4 نقط)

نعتبر المتتالية العددية (U_n) المعرفة على \mathbb{N} كما يلي: $U_0 = 11$ و $U_{n+1} = 2 + \sqrt{U_n - 2}$

1- برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $3 \leq U_n \leq 11$.

2- أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $U_{n+1} - U_n = (\sqrt{U_n - 2})(1 - \sqrt{U_n - 2})$.
ب) بين أن المتتالية (U_n) متناقصة وبرر تقارها.

3- أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $0 \leq U_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{2}(U_n - 3)$.

ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ثم استنتاج $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n - 3 \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

4- لتكن (V_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} كما يلي :

أ) برهن أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ويطلب تعين حدتها الأولى V_0 .

ب) أكتب عبارة الحد العام L : (V_n) ثم استنتاج عبارة U_n بدلالة n .

5- احسب المجموع S حيث: $S = V_{1440} + V_{1441} + \dots + V_{2019}$

ثم استنتاج الجداء: $P = (U_{1440} - 2)(U_{1441} - 2) \dots (U_{2019} - 2)$.

التمرين الثاني (4 نقط)

يحتوي كيس على ثمانى كرات لا يمكن التمييز بينهما باللمس وتحمل الأرقام التالية: 4، 2، 2، 2، 2، 1، 0، 0.
نسحب عشوائيا وفي أن واحد ثلاثة كرات من الكيس :

1) نعتبر الحدتين :

A : من بين الكرات المسحوبة لا توجد أية كرة تحمل رقم 0.

B : جداء الأرقام التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة يساوي 8.

أ) بين أن: $P(B) = \frac{5}{14}$ وأن $P(A) = \frac{1}{7}$.

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة جداء الأرقام التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة

أ) عين قيم المتغير العشوائي X .

ب) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

ج) احسب الأمل الرياضي والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .

التمرين الثالث : 5.5 نقط

في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (O, \vec{u}, \vec{v}) نعتبر النقط A, B و C ذات اللواحق على الترتيب :

$$z_C = 2, z_B = -1 - i\sqrt{3}, z_A = -1 + i\sqrt{3}$$

ا) اكتب العدد المركب $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ على الشكل الأسوي .

ب) استنتج طبيعة المثلث ABC .

ج) عين Ω و r مركز ونصف قطر الدائرة (γ) المحيطة بالمثلث ABC .

2- ا) عين طبيعة وعناصر المجموعة (Γ) للنقط (z) بحيث : $z\bar{z} + 2(z + \bar{z}) = 0$ محيط $M(z)$.

ب) تحقق أن النقطتان A و B تنتميان إلى المجموعة (Γ) .

3- ليكن R الدوران الذي يتركز في النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

أ) عين صورة النقطة B بالدوران R .

ب) عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالدوران R ثم استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

ج) عين صورة النقطة Ω بالدوران R ثم استنتج مما سبق صورة المجموعة (Γ) بالدوران R .

د) عين طبيعة (Δ) مجموعة النقط (z) من المستوى حيث : $z = z_\Omega + ke^{\frac{i\pi}{4}}$ و k عدد حقيقي .

ثم جد معادلة ديكارتية $L(\Delta)$.

التمرين الرابع : 6.5 نقط

الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ : $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$

و (C_f) تمثلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس .

1) احسب $f(x)$ ، ثم بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) بين أنه لأجل كل $x \in D_f$ فإن : $f'(x) = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1} > 0$

3) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

4) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ يحوار $+00$ ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة $L(\Delta)$.

5) بين المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حللاً وحيداً α حيث $1,8 < \alpha < 1,9$

6) أكتب معادلة $L(T)$ مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

7) بين أنه لأجل كل $x \in D_f$ فإن : $f''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1} < 0$

ثم استنتج أن : (C_f) يقبل نقطي انعطاف يطلب تعبيئهما .

8) أحسب $f(3); f(0)$ ثم أرسم كلام من (Δ) و (T) و (C_f) .

9) باقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m وجود عدد حلول المعادلة ذات المجهول x : $(x^2 + 1)e^{-(x+m)+1} = 1$

الموضوع الثاني :

التمرين الأول (04 نقاط)

1. دالة معرفة على المجال $[2, +\infty]$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x^2 + 1}$
- ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[2, +\infty]$
 - متالية معرفة على \mathbb{N} كما يلي : $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = \frac{5}{2}$
 - برهن بالترابع انه من اجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن $u_n < 3$ ثم استنتج انه من اجل $n \in \mathbb{N}$
 - أثبت أن المتالية (U_n) متناقصة تماماً ثم استنتج أن المتالية (u_n) متقاربة.
 - تحقق انه من اجل $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n^2}{u_n^2 + 1}(u_n - 2)$
 - أثبت انه من اجل $n \in \mathbb{N}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n - 2 \leq \left(\frac{9}{10}\right)^n$ ثم استنتاج

التمرين الثاني (05 نقاط)

يعرض متجر تخفيضات هامة أثناء بيع جزء من مدخلاته للأحذية التي تشمل ثلاثة أنواع A ، B و C في المتجر يوجد ربع المدخلات من النوع A وخمسها من النوع B أما البقية من النوع C ، 24% من السلعة A و 75% من السلعة B و 20% من السلعة C كلها مخفضة الأثمان.

اشتري زبون من المتجر حذاء بطريقة عشوائية ، نعتبر الأحداث التالية :

- S : الحذاء الذي اشتراه الزبون من السلعة المخفضة. A : الحذاء الذي اشتراه الزبون من السلعة A .
 B : الحذاء الذي اشتراه الزبون من السلعة B . C : الحذاء الذي اشتراه الزبون من السلعة C .
- أحسب الاحتمالات $P(C)$ ، $P(B)$ و $P(A)$.

- قدم شجرة الاحتمالات التي تندرج هذه الوضعية ثم بين أن : $P(S) = \frac{8}{25}$.

- استنتاج احتمال أن يكون الحذاء من النوع B علماً أنه من السلعة المخفضة.

- نختار بطريقة عشوائية على التوالي مع إرجاع 3 أحذية.

- أحسب احتمال الحدث D : الحصول على حذاء واحد فقط من السلعة المخفضة.

- نختار بطريقة عشوائية على التوالي مع إرجاع n حذاء.

- نعتبر E الحدث : الحصول على الأقل على حذاء واحد من بين n حذاء من السلعة المخفضة.

$$(1) \text{ بين أن : } P(E) = 1 - \left(\frac{17}{25}\right)^n$$

- عين أصغر قيمة لـ n حتى يكون $P(E) \geq 0.999$

التمرين الثالث (05 نقاط)

- حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة : $(z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$.

- في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o; \bar{u}; v)$ نعتبر النقط A ، B ، C و D ذات اللواحق :

$$z_D = \bar{z}_C \quad z_C = 3 + 2i\sqrt{3} \quad z_B = \bar{z}_A \quad z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$$

- بين أن النقط A ، B ، C و D تنتهي لنفس الدائرة ذات المركز النقطة Ω حيث : $z_\Omega = 3$ يطلب تعين نصف قطرها

$$\text{ب) بين أن: } \left(\frac{z_D - 1}{4}\right)^{1439} + \left(\frac{z_C - 1}{4}\right)^{2018} = z_A$$

3. لتكن النقطة E نظيرة D بالنسبة للمبدأ O .

(أ) اكتب العدد المركب $\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B}$ على الشكل الأسوي ثم استنتج طبيعة المثلث BEC

ب) بين وجود دوران r مركزه النقطة B وينتهي إلى C يطلب تعين زاويته.

4. التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة (z) من المستوى النقطة $(M'(z))$ من المستوى حيث:

$$z' = (1 - i\sqrt{3})z + 3$$

أ) عين الطبيعة والعناصر المميزة للتحويل S .

ب) (δ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوى حيث: $|iz - 3i| = |-3 + i\sqrt{3}|$

عين المجموعة (δ) ثم أوجد صورة (δ) بالتحويل S

ج) عين المجموعة (φ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوى حيث: $\operatorname{Arg}\left(\frac{z}{z}\right) = 2\pi k$ مع $z \neq 0$ و k عدد صحيح نسبي.

التمرين الرابع (06 نقاط)

أ. نعتبر الدالة g المعرفة على $[0; +\infty]$ كما يلي:

1) احسب نهايات الدالة g عند 0 و $+\infty$.

2) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

3) بين أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $1,4 < \alpha < 1,5$ ، ثم استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $[0; +\infty]$.

أ. دالة معرفة على $[0; +\infty]$ بـ $f(x) = 1 + (x - 2)\ln x$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متواحد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) احسب نهاية الدالة f عند 0 و عند $+\infty$ ثم فسر النهاية عند 0 هندسياً.

2) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول التغيرات.

3) بين أن: $\alpha = 1,45$ ثم أعط قيمة مقربة لـ $f(\alpha)$ من أجل α^2 .

4) (T_{x_0}) هو المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة M_0 ذات الفاصلية x_0 .

أ) اكتب المعادلة الديكارتية للمماس (T_{x_0}) .

ب) عين x_0 إذا علمت أن المماس (T_{x_0}) يمر بالنقطة $A(2; 0)$.

ت) استنتاج أن (C_f) يقبل مماسين يمران بالنقطة A ثم اكتب معادلة كل منها.

5) ارسم كلاً من المماسين والمنحنى (C_f) .

III. نعتبر المستقيم (D_m) ذو المعادلة $y = mx - 2m$ حيث m وسيط حقيقي.

1) تتحقق أن (D_m) يمر بالنقطة A .

2) نقاش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx - 2m$