

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية العقيد احمد بن عبد الرزاق

دورة م \_\_\_\_\_ اي 2019

الشعبة : علوم تجريبية

المدة : 03 ساعات ونصف

مديرية التربية لولاية وهران

امتحان البكالوريا التجاري

المستوى : سنة ثالثة

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين :

## الموضوع الأول

### التمرين الأول : (04 نقاط)

نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{u_n^2 + 1}{2}} \end{cases}$$

- 1/ أ- احسب الحدود  $u_1, u_2, u_3$  ثم برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n > 1$  .  
ب- بين أن المتتالية  $(u_n)$  متناقصة تماما على  $\mathbb{N}$  .  
ج- بين أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة، ثم استنتج نهايتها .

2/ نعتبر المتتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:

- أ- بين أن  $(v_n)$  متتالية هندسية يتطلب تعين أساسها وحدتها الأولى  $v_0$  .

ب- اكتب بدلالة  $n$  كلاما من  $v_n$  و  $u_n$  ، ثم احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  .

- 3/ احسب بدلالة  $n$  كلاما من الجميع التالية:  $T_n = v_0 + 2v_1 + \dots + 2^n v_n$  ،  $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2$  و  $L_n = \ln v_0 + \ln v_1 + \dots + \ln v_n$  .

### التمرين الثاني : (04 نقاط)

- ا. حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  التالية:  $(z - 2)(z^2 + 2z + 4) = 0$  .

ii. نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعارد والمتجانس  $(0; \vec{u}; \vec{v})$  النقط :

$z_C = 2$  ،  $z_B = -1 - i\sqrt{3}$  ،  $z_A = -1 + i\sqrt{3}$  ،  $A, B, C$  و  $A$  التي لاحقاتها على الترتيب

$$. ABC \quad . \frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} = e^{i \frac{\pi}{3}} \quad (1)$$

2) عين مركز ونصف قطر الدائرة  $(C)$  المحيطة بالمثلث  $ABC$  . ارسم  $(C)$  .

3) عين الطبيعة والعناصر الهندسية للمجموعة  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوى ذات اللاحقة التي تتحقق:  
 $(z + \bar{z})^2 + z \cdot \bar{z} = 0$  . ثم تحقق أن النقطتين  $A$  و  $B$  تنتهيان إلى  $(\Gamma)$  .

4) أكتب العبارة المركبة للدوران  $R$  الذي مر锴ه  $A$  وزاويته  $\frac{\pi}{3}$  ، ثم عين صورة النقطة  $B$  بالدوران  $R$  .

ثم لاحقة النقطة  $D$  صورة النقطة  $C$  بالدوران  $R$  ثم استنتج طبيعة الرباعي  $ABCD$  .

- عين صورة المجموعة  $(\Gamma)$  بالدوران  $R$  .

↶ اقلب الورقة

### التمرين الثالث : (50 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم المتعامد والمتجانس ( $\bar{0}; \bar{i}; \bar{j}; \bar{k}$ )

نعتبر النقط  $A(0;0;1)$ ,  $B(2;2;-1)$ ,  $C(-3;4;4)$  و  $D(-2;7;-7)$  المستوي ( $P$ ) المعرف بالتمثيل الوسيطي :

$$\begin{cases} x = 3\alpha + \beta + 1 \\ y = -2\alpha + 1 \\ z = \alpha + \beta + 4 \end{cases}, \quad \alpha \text{ و } \beta \text{ وسيطان حقيقيان}$$

1. أبين أن النقط  $A$ ,  $B$ ,  $C$  تعين مستويات

بـ تحقق أن الشعاع  $(3;-2;1)$  ناظمي للمستوي ( $ABC$ ) ثم أكتب معادلة ديكارتية له.

2. أكتب معادلة ديكارتية للمستوي ( $P$ ) ثم بين أن المستويين ( $P$ ) و ( $ABC$ ) متعامدان.

بـ بين أن تقاطع ( $P$ ) و ( $ABC$ ) هو المستقيم ( $\Delta$ ) ذو التمثيل الوسيطي  $t \in \mathbb{R}$  :  $\begin{cases} x = t - 2 \\ y = 4t - 7 \\ z = 5t - 7 \end{cases}$

جـ أحسب المسافة بين النقطة  $D$  والمستوي ( $ABC$ ) والمسافة بين النقطة  $D$  والمستوى ( $P$ )  
ثم استنتج المسافة بين النقطة  $D$  والمستقيم ( $\Delta$ )

3. (q) المستوي الذي يشمل النقطة  $D$  والعمودي على كل من المستويين ( $P$ ) و ( $ABC$ )

أـ أكتب معادلة ديكارتية للمستوي ( $q$ )

بـ بين أن المستويات الثلاثة ( $P$ ) و ( $ABC$ ) و ( $q$ ) تتقاطع في نقطة واحدة  $H$  ثم عين إحداثيات  $H$

جـ أحسب بطريقة ثانية المسافة بين النقطة  $D$  والمستقيم ( $\Delta$ )

### التمرين الرابع : (70 نقاط)

نعتبر الدالة  $f(x) = x + 1 + \ln(x+1) - \ln(x+2)$  كما يلي على المجال  $[+∞; -1]$

. تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ( $\bar{0}; \bar{i}; \bar{j}$ ) وحدة الطول 2 cm.

1. أحسب  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ .

2. بين أن  $0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x+2}\right)$ , ثم استنتاج نهاية الدالة  $f$  عند  $+\infty$ .

3. بين أن المستقيم ( $\Delta$ ) ذو المعادلة  $y = x + 1$  هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى ( $C_f$ ) عند  $+\infty$   
ثم أدرس وضعية المنحنى ( $C_f$ ) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل.

4. أدرس تغيرات الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها.

5. أكتب معادلة المماس ( $T$ ) عند النقطة التي فاصلتها  $x = 0$ .

6. بين أن المنحنى ( $C_f$ ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها  $\alpha$  حيث  $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ .

7. أرسم المنحنى ( $C_f$ ) والمستقيمان ( $T$ ) و ( $\Delta$ ).

8. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  حلول المعادلة  $m = \frac{3}{2}x + m$

9. أـ بين أن الدالة  $F_a : x \rightarrow \ln(x+a)$  هي دالة أصلية للدالة  $f_a : x \rightarrow \ln(x+a) - x$   
على المجال  $[-a; +\infty]$ .

بـ أحسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز للمحده بالمنحنى ( $C_f$ ) والمستقيمات  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = x + 1$ .

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول : (55 نقاط)


1. نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  كثير (z) ذات المتغير Z حيث :  $p(z) = z^3 - 6z^2 + 4z + 40$
- عین العددين الحقيقيين a و b حيث :  $p(z) = (z+2)(z^2 + az + b)$
  - حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $p(z) = 0$ .
2. في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(\bar{j}; \bar{i}; 0)$
- نعتبر النقط A و B ، Z<sub>A</sub> = 5 - i ، Z<sub>B</sub> = 4 + 2i ، Z<sub>C</sub> = -2 ذات الواقع :  $L = \frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_B}$  على الشكل الجبري، وعلى الشكل الأسني . ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
  - أحسب قيمة العدد :  $\left(\frac{L}{2}\right)^{2019} - i\left(\frac{L}{2}\right)^{1440}$
  - أوجد قيمة العدد الطبيعي n بحيث يكون  $L^n$  عدد حقيقي موجب تماماً.
3. ليكن f التحويل النقطي الذي يرافق بكل نقطة M ذات اللاحقة Z النقطة M' ذات اللاحقة Z' حيث :  $Z' = -2iZ + 10i$
- عین طبيعة التحويل f محدداً عناصره المميزة .
  - أكتب العبارة المركبة للدوران الذي مرکزه B و زاويته  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  .
  - أوجد لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالدوران r .
4. بين أن النقط A ، B و D على استقامية، ثم استنتاج أن التحويل f مركب من تحويلين يتطلب تعبيئهما .

### التمرين الثاني : (40 نقاط)

- نعتبر الدالة f المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  بـ :  $f(x) = \frac{2x+2}{x+3}$
1. ادرس تغيرات الدالة f ، ثم بين أنه من أجل كل x من المجال  $[0; 1]$  فإن  $f(x) \in [0; 1]$  .
2. نعتبر المتتالية العددية  $(U_n)$  المعرفة بـ :  $U_0 = 0$  ومن أجل كل عدد طبيعي n ،  $U_{n+1} = f(U_n)$  . في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد ومتجانس ، مثلنا الدالة f بالمنحي (C) والمستقيم (D) الذي معادلته  $y = x$  كما هو في الشكل (في الورقة المرفقة (1) تعاد مع ورقة الإجابة).
- مثل على محور الفواصل الحدود  $U_0, U_1, U_2, U$  ، دون حسابها مع إظهار خطوط التمثيل.
  - ما هو تخمينك حول اتجاه تغير المتتالية  $(U_n)$  وتقاريبها؟
3. أ. برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ،  $0 \leq U_n \leq 1$  .
- ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ،  $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + 2)(1 - U_n)}{U_n + 3}$  ، ثم استنتاج اتجاه تغير المتتالية  $(U_n)$  .
- ج. استنتاج أن المتتالية  $(U_n)$  متقاربة . احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  .
4. نعتبر المتتالية  $(V_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ :  $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 2}$
- بين أن المتتالية  $(V_n)$  هندسية يتطلب تعبيئ أساسها وحدتها الأولى.
  - أكتب بدلالة n عبارة الحد العام  $V_n$  ، واستنتاج عبارة  $U_n$  بدلالة n . ثم احسب مرة أخرى  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  .

اقلب الورقة

### التمرين الثالث : (04.5 نقاط)



إناءان  $U_1$  و  $U_2$  حيث  $U_1$  يحتوي على ثلاثة كرات بيضاء وكرتان سوداء و  $U_2$  يحتوي على كرتان بيضاوان وثلاثة كرات سوداء .  
نسحب كرتان دفعة واحدة من كل منها  
(علماء أن الكرات متجانسة في اللمس) فنحصل بذلك على أربع كرات .

- نهتم بعدد الكرات البيضاء المسحوبة من الإناء  $U_1$  و عدد الكرات البيضاء المسحوبة من الإناء  $U_2$
- بين أن احتمال سحب كرتين بيضاوين من الإناء  $U_1$  هو  $p_1 = 0,3$  و من الإناء  $U_2$  هو  $p_2' = 0,1$
- شكل الشجرة المثلثة المناسبة .
- برهن أن احتمال الحادثة E "ضمن الكرات المسحوبة يوجد بالضبط كرتان بيضاوان" هو: 0,46 .
2. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات البيضاء المحصل عليها.

أـ حدد قانون الاحتمال لـ X .  
بـ اللاعب يدفع 2,50DA قبل إجراء السحب . ويكسب 1DA لكل كرة بيضاء مسحوبة . هل اللعبة مريحة له؟

3. احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء فقط من الإناء  $U_2$  علماء أنه حصل على كرتين بيضاوين .

### التمرين الرابع : (06.5 نقاط)

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$  . حيث  $a$  ،  $b$  و  $c$  أعداد حقيقة و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم متواحد ومتجانس

- 1ـ عين الأعداد الحقيقة  $a$  ،  $b$  و  $c$  بحيث يقبل  $(C_f)$  عند النقطة  $(0; -3)$  مماسا معامل توجيهه 3 و العدد  $\sqrt{3}$  حل للمعادلة  $f(x) = 0$  .

2ـ نضع  $c = -3$  ،  $b = 0$  ،  $a = 1$

أحسب  $(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ثم أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها .

- 3ـ أكتب معادلة  $L$  (T) مماس المنحنى  $(C_f)$  عند النقطة التي فاصلتها  $x = 0$  ثم عين إحداثيات نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل .

4ـ أرسم  $(T)$  و  $(C_f)$  .


- 5ـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $\mathbb{R}$  فإن  $f(x) + 2f'(x) + f''(x) = 2e^{-x}$  ثم استنتج دالة أصلية للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$  .

- 6ـ أحسب بوحدة المساحات ، مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما  $x = 1$  و  $x = 3$  .

7ـ وسيط حقيقي ؛ نقش بيانيا وحسب قيم  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة  $x^2 - 3 + me^x = 0$  .

### انتهى الموضوع الثاني


©اساتذة المادة يتمنون لكم النجاح في شهادة البكالوريا ☺



الورقة المرفقة (1) تعداد مع ورقة الإجابة

الإسم: .....  
اللقب: .....

صفحة 5 من 5



الورقة المرفقة (1) تعداد مع ورقة الإجابة

الإسم: .....  
اللقب: .....