



**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

الديوان الوطني لامتحانات و المسابقات  
المقاطعة رقم 1 لولاية غرداية

وزارة التربية الوطنية  
امتحان البكالوريا التجريبية

دورة : ماي 2019

الشعبية : علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :  
الموضوع الأول :

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

(1) أحسب  $U_1$  ،  $U_2$  ثم برهن بالتراجع انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $U_n = 5 - \frac{4}{U_{n-1}}$  كمايلي  $2 \leq U_n \leq 4$

(2) بين ان  $(U_n)$  متزايدة . ثم استنتج أنها متقاربة .

(3) برهن انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $4 - U_{n+1} \leq \frac{4 - U_n}{2}$

(4) استنتاج انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = (\frac{1}{2})^{n-1} \leq 0$  ثم احسب

**التمرين الثاني: (05 نقاط)**

في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ . نعتبر النقط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  و  $D$  لواحقها على الترتيب  $Z_D = \overline{Z_C}$  ،  $Z_B = \overline{Z_A}$  ،  $Z_A = i\sqrt{3}$  ،  $Z_C = 3 + 2i\sqrt{3}$  ،  $Z_D = Z_A + Z_C$  حيث:

$$(1) \text{ بين أن: } \left( \frac{1+Z_A}{2} \right)^{2019} + \left( \frac{1-Z_A}{2} \right)^{2019} = -2$$

$$- \text{ عين قيمة العدد الطبيعي } n \text{ بحيث: } \left( \frac{1+Z_A}{2} \right)^n - \left( \frac{1-Z_A}{2} \right)^n = 0$$

(2) تحقق أن:  $\frac{Z_C - Z_A}{Z_D - Z_A} = \frac{Z_D - Z_B}{Z_B - Z_C}$  ثم استنتاج أن النقط  $A, B, C, D$  تنتهي إلى نفس الدائرة يطلب تعين عناصرها المميزة.

(3) عين طبيعة الرباعي  $ABDC$  ثم احسب مساحته.

(4) التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة  $M$  ذات اللحقة  $Z$  النقطة  $M'$  ذات اللحقة  $Z'$  حيث:

$$Z' = \frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}(Z - Z_A) + Z_A$$

$$. \text{ عين طبيعة التحويل } f \text{ و عناصره المميزة .}$$

(5) مجموعة النقط  $M$  ذات اللحقة  $Z$  حيث:  $Z \neq Z_B$  و  $Z \neq Z_A$  (المعروف بالعلاقة:

$$k \in \mathbb{Z} \text{ مع } (E) : \arg(Z^2 + 3) = \arg(Z + i\sqrt{3}) + 2k\pi$$

- بين أنه يمكن كتابة العلاقة للمجموعة  $(E)$  على الشكل:  $\arg(Z - Z_A) = 2k\pi$  ثم استنتاج طبيعة المجموعة  $(E)$ .



### التمرين الثالث: (04 نقاط)

ت تكون باقة ورد من أربع وردات حمراء وثلاث وردات بيضاء وورديتين لونهما أصفر.

- I) نختار عشوائيا وفي آن واحد ثلاثة وردات من هذه الباقة.  
ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الوردات الصفراء المختارة.

  - (1) أعط قانون احتمال المتغير العشوائي  $X$ .
  - (2) أحسب  $E(X)$  الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$ .

II) نختار على التوالي وبدون إرجاع ثلاثة وردات من هذه الباقة.  
نعتبر الحادثتين التاليتين:

الحدث  $A$ : ” اختيار ثلاثة وردات من نفس اللون ” .

الحدث  $B$ : ” اختيار وردين على الأقل لونهما أحمر ” .

  - (1) أحسب الإحتمالات التالية  $P(A \cap B)$  ،  $P(A)$  و  $P(B)$  .
  - (2) علما أن الوردات المختارة من نفس اللون ، ما هو الاحتمال أن تكون حمراء. (الحدث  $R$ : اختيار ثلاثة وردات حمراء)

#### **التمرين الرابع: ( 07 نقاط )**

- (I) يعطى في الشكل المرفق المحننين  $(C_1)$  و  $(C_2)$  لدالتي معرفتين وقابلتين للاشتقاء على  $\mathbb{R}$  ، نعلم أن احدى هاتين الدالتي هي الدالة المشتقة للأخرى ، نرمز إليهما إذن بـ  $g$  و  $g'$  .  
 (1) أرفق كل دالة منهما بثتميلها البياني.

(2) على المجال  $[-\frac{3}{2}; 5]$  شكل جدول تغيرات الدالة  $g$ .

(3) ما هو معامل توجيه المماس للمنحي  $(C_1)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(II) لتكن المعادلة التقاضلية  $(E)$ :  $y' + y = 2(x+1)e^{-x}$   
 (1) بين أن الدالة  $f_0$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $f_0(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$  حل للمعادلة  $(E)$ .  
 (2) حل المعادلة التقاضلية  $(E')$ :  $y' + y = 0$ .

(3) بين أن  $f$  حل للمعادلة  $(E)$  إذا وفقط إذا كانت الدالة  $u = f - f_0$  حيث  $u$  حلاً للمعادلة  $(E')$ .  
 (4) استنتج من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}$  ، عبارة  $f(x)$  عندما تكون  $f$  حلاً للمعادلة  $(E)$ .  
 (5) علماً أن الدالة  $g$  المعرفة في الجزء  $(I)$  حل للمعادلة  $(E)$  عين  $(g(x))$  من أجل كل عدد حقيقي  $x$ .  
 (6) عين الحل  $h$  للمعادلة  $(E)$  الذي تتميله البياني يقبل في النقطة ذات الفاصلة 0 مماساً معادل توجيهه معروضاً.

(III)  $f$  هي الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $f(x) = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$   
 (1) عين نهاية  $f$  عند  $+\infty$  و عند  $-\infty$ .  
 (2) نعلم أن الدالة  $f$  تقبل الاشتقاء على  $\mathbb{R}$  ، عين دالتها المشتقة وأدرس اشارتها، ثم أنجز جدول تغيراتها.  
 (3) في معلم متعدد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  (وحدة الطول  $2cm$ ) ، نسمى  $(C_f)$  التمثيل البياني للدالة  $f$ .  
 (4) عين معادلة لـ  $(d)$  مماس المنحي  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 1.



20462601812018


ب) أنشئ المماس ( $d$ ) والمنحنى ( $C_f$ ) في المعلم.

4) لتكن الدالة  $F$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$

ا) عين الأعداد الحقيقة  $a$ ،  $b$  و  $c$  حتى تكون  $F$  دالة أصلية لـ  $f$  على  $\mathbb{R}$ .

ب) أحسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى ( $C_f$ ) وبمحور التراتيب و محور الفواصل والمستقيم ذي المعادلة

$$x = 1$$





## الموضوع الثاني :

### التمرين الأول: (4 نقاط)

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتاجنس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

الدالة المعرفة على المجال  $[1, +\infty)$  بالشكل:  $f(x) = 1 + \sqrt{x-1}$  ، و ليكن  $(C_f)$  المنحنى الممثّل لها.

(Δ) المستقيم ذو المعادلة  $y = x$  (كما هو موضح في الشكل 1).

ولتكن  $(U_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بحدها الأول  $U_0 = \frac{3}{2}$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  
(1) مثل على حامل محور الفواصل الحدود  $U_0, U_1, U_2$  دون حسابها مبينا خطوط الإنشاء.(الشكل 1)

ب) خمن إتجاه تغير المتتالية  $(U_n)$  وتقاربها.

ج) برهن بالترابع انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فان  $1 < U_n < 2$ .

(2) أثبت ان المتتالية  $(U_n)$  متزايدة تماما. ثم استنتج أنها متقاربة .

(3) نعتبر المتتالية  $(V_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بالشكل:  $V_n = \ln(U_n - 1)$

ا) بين أن المتتالية  $(V_n)$  هندسية يطلب تعين أساسها وحدتها الأول.

ب) أكتب عبارة الحد العام  $(V_n)$  بدلالة  $n$  ثم استنتاج

(4) احسب كلا من  $S_n$  و  $\Pi_n$  بدلالة  $n$  حيث:

$$\Pi_n = (U_0 - 1)(U_1 - 1)(U_2 - 1) \dots (U_n - 1)$$

$$\cdot S_n = V_0^2 + V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2$$

### التمرين الثاني: (5 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة:  $(Z + \sqrt{3} - 3i)(Z^2 - 6Z + 12) = 0$

في المستوى المركب المزود بمعلم متعامد متاجنس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

نعتبر النقط  $A, B, C$  التي لواحقها على الترتيب.

ا) أكتب كلا من  $Z_A$  و  $Z_C$  على الشكل الأسني ثم استنتاج طبيعة المثلث  $OAC$ .

$$(b) \text{ أحسب } \left( \frac{Z_A}{2\sqrt{3}} \right)^{1440} + i \left( \frac{Z_B}{2\sqrt{3}} \right)^{2019}$$

(3) لتكن النقطة  $D$  نظيرة  $C$  بالنسبة إلى محور الفواصل ، بين أن المستقيمين  $(AD)$  و  $(BC)$  متعامدان.

(4) عين نسبة وزاوية التشابه المباشر  $S$  الذي مركزه  $E(3 - \sqrt{3}, 0)$  ويحول النقطة  $A$  إلى النقطة  $C$ .

(5) بين أن النقط  $C, O, E, A$  تنتهي إلى دائرة واحدة يطلب تعين مركزها ونصف قطرها.



### التمرين الثالث: (40 نقاط)

يحتوي صندوق  $U_1$  على 4 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء ، و يحتوي صندوق  $U_2$  على كرتين حمراوين و 5 كرات بيضاء ، و يحتوي صندوق  $U_3$  على 3 كرات تحمل الرقم 1 و كرتين تحملان معاً الرقم 2.

(1) نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات من  $U_1$ ، (ولا نهتم بالصندوقين  $U_2$  و  $U_3$ ).

(ا) ما هو عدد الحالات الممكنة .

(ب) ما هو احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.

(ج) ما هو احتمال الحصول على كرة بيضاء على الأقل.

(د) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات البيضاء المسحوبة.

- حدد قانون احتمال  $X$ .

(2) نسحب الآن كرة من  $U_3$ . إذا كان رقمها هو 1 نسحب كرة من  $U_1$ ، أما إذا كان رقمها هو 2 فنسحب كرة من  $U_2$ .

(ا) ما هو احتمال الحصول على كرة حمراء.

(ب) علماً أن الكرة المسحوبة حمراء ، ما هو احتمال كونها مسحوبة من  $U_1$ .

(نسمى الأحداث التالية الحدث  $R$ : الكرة المسحوبة حمراء ، الحدث  $A_1$ : الكرة مسحوبة من الصندوق

$U_3$  وتحمل الرقم 1 ، الحدث  $A_2$ : الكرة مسحوبة من الصندوق  $U_3$  وتحمل الرقم 2 ، الحدث  $B$ : الكرة

مسحوبة من الصندوق  $(U_1)$

### التمرين الرابع: (70 نقاط)

الدالة المعرفة على  $\{ -1; 2 \} - \{ \}$  كمالي  $f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{x^2 - x - 2}$  ولتكن  $(C_f)$  تمثلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

(1) أحسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة تعريفها ثم فسر النتائج هندسياً.

(2) (ا) بين أنه من أجل كل  $x$  من  $\{ -1; 2 \} - \{ \}$  لدينا:

$$f'(x) = \frac{-2x(x+4)}{(x^2 - x - 2)^2}$$

(ب) استنتج إتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها.

(3) (ا) ادرس الوضع النسبي للمنحنى  $(C_f)$  و المستقيم  $(\Delta)$  المقارب الأفقي له.

(ب) عين نقاط تقاطع  $(C_f)$  مع محوري الإحداثيات.

(ج) ارسم المستقيمات المقاربة والمنحنى  $(C_f)$ .

(د) نقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة:

$$(3-m)x^2 + (m-1)x + 2(m-1) = 0$$

(4) (ا) عين الأعداد الحقيقية  $a$  ،  $b$  و  $c$  بحيث من أجل كل عدد حقيقي  $x$  يختلف عن  $-1$  و  $2$  لدينا:

$$f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-2}$$

(ب) إستنتاج دالة أصلية للدالة  $f$  على المجال  $[2, +\infty)$ .

(5) لتكن  $(S(\lambda))$  مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيمات  $y = 3$  و  $x = \lambda$  و  $x = 3$  حيث:

$\lambda$  عدد حقيقي ينتمي إلى المجال  $[2, 3]$ .

(ا) أحسب المساحة  $S(\lambda)$  بدلالة  $\lambda$ .




ب) أحسب  $\lim_{\lambda \rightarrow 2} S(\lambda)$ .

6) لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$  كمايلي:

أ) برهن أن  $g$  دالة زوجية على مجموعة تعريفها.

ب) أدرس قابلية إشتقاق الدالة  $g$  عند  $x_0 = 0$  وفسر النتيجة هندسيا.

7) أكتب الدالة  $g$  دون رمز القيمة المطلقة. و باستعمال المنحني  $(C_f)$  أنشئ المنحني  $(C_g)$  الممثل للدالة  $g$ .



الشكل-1-