


## الاختبار المحروس الأول في مادة الرياضيات

## التمرين الأول



➤ لتكن  $f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = (x+3)e^x - 1$

ليكن تمثيلها البياني كما هو في الشكل المقابل. بقراءة بيانية:

1- أوجد نهايتي الدالة  $f$  عند طرفي مجموعة التعريف.

2- شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

3- بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  على  $\mathbb{R}$

4- تحقق حسابيا أن  $-0,8 < \alpha < -0,7$

5- استنتج إشارة الدالة  $f$ .

➤ لتكن  $g$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $g(x) = (x+2)(e^x - 1)$ ، وليكن  $(C_g)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1- أوجد نهايتي الدالة  $g$  عند طرفي مجموعة التعريف.

2- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  لدينا:  $g'(x) = f(x)$ . ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $g$ .

3- بين أن المستقيم  $(d)$  ذي المعادلة  $y = -x - 2$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_g)$  بجوار  $-\infty$ .

4- أدرس الوضعية النسبية بين  $(C_g)$  و  $(d)$ .

5- أكتب معادلة  $(T)$  مماس المنحنى  $(C_g)$  عند النقطة  $(0,0)$

6- عين معادلة  $(\Delta)$  مماس المنحنى  $(C_g)$  والذي يوازي المستقيم  $(d)$ .

7- أرسم كلا من:  $(\Delta)$ ،  $(T)$ ،  $(d)$  و  $(C_g)$  في معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

8- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة  $(x+2)e^x = 3x + m$

## التمرين الثاني

i. لتكن  $f$  الدالة المعرفة على  $]0, +\infty[$  بـ  $f(x) = 1 + x - \ln x$

1- أدرس تغيرات الدالة  $f$ . ثم شكل جدول تغيراتها، ثم استنتج إشارة الدالة  $f$ .

ii. نعتبر  $g$  الدالة المعرفة على  $]0, +\infty[$  بـ  $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln x$

1- أحسب نهايتي الدالة  $g$  عند طرفي مجموعة التعريف.

2- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب  $x$  لدينا  $g'(x) = \frac{f(x)}{x^2}$

3- أدرس تغيرات الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها.

4- أحسب معادلة  $(T)$  مماس المنحنى  $(C_g)$  عند النقطة ذات الفاصلة 1.

5- أرسم  $(C_g)$  و  $(T)$  في معلم متعامد ومتجانس.

❖ لتكن  $h$  الدالة المعرفة على  $]-1, +\infty[$  بـ  $h(x) = \frac{x+4}{x+1}$

(1) أدرس تغيرات الدالة  $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) مثل بدقة التمثيل البياني للدالة  $h$  على معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❖ نعتبر المتتالية  $(V_n)$  المعرفة من أجل كل عدد حقيقي  $n$  بـ  $V_0 = 0$  و  $V_{n+1} = h(V_n)$

(3) في نفس الرسم السابق مثل على محور الفواصل الحدود الأولى للمتتالية  $(V_n)$ .

(4) خمن اتجاه تغير المتتالية  $(V_n)$  وتقارها.

(5) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن:  $0 \leq V_n \leq 4$

(6) أدرس اتجاه تغير المتتالية  $(V_n)$ .

❖ نعتبر المتتالية  $(U_n)$  المعرفة من أجل كل عدد حقيقي  $n$  بـ  $U_n = \frac{2-V_n}{V_n+2}$

(7) بين أن المتتالية  $(U_n)$  هندسية عين أساسها وحدها الأول  $U_0$ .

(8) أكتب بدلالة  $n$  عبارة  $U_n$ ، ثم استنتج عبارة  $V_n$  بدلالة  $n$ .

(9) أحسب  $\lim V_n$

❖ نعتبر المتتالية  $(W_n)$  المعرفة من أجل كل عدد حقيقي  $n$  بـ  $W_n = \ln|U_n|$

(10) تحقق أن المتتالية  $(W_n)$  حسابية، عين أساسها، حددها الأول  $W_0$  وعبارة حددها العام  $W_n$

(11) أحسب بدلالة  $n$  المجاميع الآتية:

$$S_n = U_0 \times U_1 \times \dots \times U_n$$

$$S'_n = U_0^2 + U_1^2 + \dots + U_n^2$$