

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

في المستوى المنسوب إلى المعلم $(O; \bar{i}; \bar{j})$ نعتبر النقط A, B, C و $B(1; 1)$; $A(2; -1)$; $C\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$ حيث

1/ هل النقط A, B و C في استقامية ، عل؟

2/ أكتب معادلة للمستقيم (D_1) الذي يشمل النقطتين A و B

3/ جد معادلة للمستقيم (D_2) الذي يشمل المبدأ و \vec{u} شاع ثوجيه له حيث $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

4/ نعتبر جملة المعادلين (S) حيث :

$$(S) \begin{cases} 2x + y = 3 \\ kx - y = 0 \end{cases}$$

أ. ما هي القيم الممكنة للعدد الحقيقي k حتى تقبل الجملة (S) حلًا وحيدًا

ب. نأخذ $k = 2$ ، حل في R^2 جملة المعادلين (S) ثم فسر هذه النتيجة هندسيا

التمرين الثاني:

المستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس $(\bar{j}; \bar{i}; O)$

I. لتكن f دالة تاليفية تمثيلها البياني (C_f) يشمل النقطتين $(-3; 0)$ و $(0; -1)$ $A(2; -3)$

1/ أعط عبارة $f(x)$ ثم أدرس اشارتها

2/ شكل جدول تغيرات الدالة f

3/ أرسم (C_f)

II. h الدالة المعرفة على R كماليي :

1/ أكتب الدالة h دون رمز القيمة المطلقة

III. نعتبر الدالة g المعرفة كماليي :

$$g(x) = x^2 - 2x - 3$$

1/ تحقق أن : $g(x) = (x - 1)^2 - 4$

2/ أدرس تغيرات الدالة g على المجالين $[+∞; 1]$ و $[1; -∞]$ ثم شكل جدول تغيراتها

3/ أثبت أن $-4 \leq g(x) \leq 1$ ثم استنتج القيم الحدية للدالة g

4/ أدرس تقاطع منحني الدالة g مع محوري الإحداثيات

5/ أشرح كيف يمكن رسم منحني (C_g) انطلاقاً من منحني الدالة مربع ثم أنشئه في نفس المعلم مع (C_f)

6/ شكل جدول إشارة $g(x)$

$$f(x) = g(x)$$

7/ حل بياني المعادلة $f(x) = g(x)$

8/ حل بياني المترابحة $f(x) < g(x)$

9/ هل تقبل المترابحة $f(x) < g(x)$ حلًا في المجال $[-1; 3]$ ، عل اجابتك