

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

تحذيب النطب واستعمال الصنع.



☆ التمارين الأولي: (07 نقاط)

(I) x عدد حقيقي، انقل ثم أكمل الجدول التالي:

المسافة	القيمة المطلقة	الحصر	نصف القطر r	المركز c	المجال
...	$x \in [-5; 3]$
...	$ x > 8$
...	...	$\dots \leq x \leq \dots$	5	2	...

(II) A و B نقطتان من مستقيم مزود بعلم $(O; I)$ فاصلتاها 1 و 3 – على الترتيب. و M نقطة كثيرة من المستقيم f الدالة التي ترقق بكل عدد حقيقي x المسافة $AM + BM$.

- ① تتحقق من أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f(x) = |x - 1| + |x + 3|$.
- ② احسب صور كل من العددين 4 و $2\sqrt{3}$ – بالدالة f .
- ③ اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
- ④ عين السوابق الممكنة للعدد 6 بالدالة f .
- ⑤ حل في \mathbb{R} المتراجحة: $f(x) \geq |x - 1| + 2$.

☆ التمارين الثاني: (06 نقاط)

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط $A(-2; 3)$ ، $B(-3; -2)$ ، $C(3; 1)$ و $E(-1; -1)$.

- ① علم النقط A ، B ، C و E .
- ② أوجد إحداثيات النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
- ③ اكتب معادلة المستقيم (AB) .
- ④ اكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة E ويواري المستقيم (AC) .
- ⑤ لتكن النقطة $F(6; \alpha)$ حيث α عدد حقيقي. عين قيمة α حتى تكون النقط A ، C و F على استقامة واحدة.

$$\text{⑥ حل جملة المعادلين } (S): \begin{cases} y = 5x + 13 \\ 5y = -2x - 7 \end{cases} \text{ ثم فسر النتيجة بيانيا.}$$

☆ التمرين التالى : (07 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة بمتى لها البياني - الشكل المقابل - بقراءة بيانية أجب على ما يلى:

① عين مجموعة تعريف الدالة f .

② أوجد صور الأعداد: -4 ، 1 و 3 بالدالة f .


③ أوجد السوابق الممكنة للأعداد: -4 ، 0 و 2 بالدالة f .

④ ادرس اتجاه تغير الدالة f على مجموعة تعريفها، ثم شكل جدول تغيراتها.

⑤ ما هي القيمة الحدية الممكنة للدالة f ، وقيم المتغير x التي تبلغ عندها هذه القيمة الحدية؟

⑥ ما قولك حول شفوعية الدالة f على مجموعة تعريفها؟ علل.

⑦ هل الدالة f زوجية على المجال $[-3; 3]$ ؟ لماذا؟



☆ انتهى الإختبار ☆

اذ انت لم تزرع دأبصربت حاصدا ☆☆ ندمت على التفريط في زمن البذر

أستاذ المادة: فراغية الصقرظ **T**

الإجابة
السؤال: كتابة $f(x) = |x-1| + |x+3|$ من النهاية المطلقة

$$f(x) = |x-1| + |x+3| \quad \text{لدينا}$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$x-1$	$-x-1$	$-x+1$	$x-1$	
$x+3$	$-x-3$	$x+3$	$x+3$	
$f(x)$	$-2x-2$	4	$2x+2$	

٤- تحديد السوابق الممكنة للحد 6:

$$|x-1| + |x+3| = 6 \text{ معناه } f(x) = 6 \quad \text{لدينا}$$

من أجل $|x-1| + |x+3| = 6 \Rightarrow x \in [-\infty, -3]$ بحيث $x \in [-\infty, -3]$

$$\text{معناه } -2x-2=6 \Rightarrow x=-4$$

لدينا $x \in [-\infty, -4]$ (حل صيغول)

$$\text{من أجل } |x-1| = 6 \Rightarrow x \in [-3, 1]$$

ولدينا $x \neq 4$ (لا يوجد حلول)

$$\text{من أجل } |x+3| = 6 \Rightarrow x \in [1, +\infty)$$

$$\text{معناه } 2x+6=12 \Rightarrow x=3$$

لدينا $x \in [1, 3]$ (حل صيغول)

ومن السوابق الممكنة لـ 6 هي $-4, -2, 3$.

٥- حل في $|x-1| + 2 > |x+3|$ اكتمل درجة

$$f(x) > |x-1| + 2 \quad \text{لدينا}$$

$$|x-1| + |x+3| < |x-1| + 2 \quad \text{معناه}$$

$$|x+3| < 2 \quad \text{معناه}$$

$$-x-3 < 2 \Rightarrow x > -5$$

$$-x > 2+3 \Rightarrow x < -5$$

$$x < -5 \quad \text{و} \quad x > -1$$

ومنه حلول اكتمل درجة هي

$$S = (-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$$

المجال	النهاية اليسرى	النهاية اليمنى	الحصص	النهاية
ال المجال	غير معرف	غير معرف	النهاية	غير معرف
النهاية اليسرى	غير معرف	غير معرف	النهاية	غير معرف
النهاية اليمنى	غير معرف	غير معرف	النهاية	غير معرف
الحصص	غير معرف	غير معرف	النهاية	غير معرف
النهاية	غير معرف	غير معرف	النهاية	غير معرف

$$\therefore f(x) = |x-1| + |x+3| \quad \text{التحقق أن}$$

ذلك كل عدد حقيقي x لدينا

$$f(x) = AM + BM$$

$$= d(x, 1) + d(x, -3)$$

$$= |x-1| + |x+3|$$

٦- صور الأعداد:

$$\therefore f(4) = |4-1| + |4+3| = 13 = 17$$

$$= 3+7 = 10$$

$$\therefore f(-2\sqrt{3}) = |-2\sqrt{3}-1| + |-2\sqrt{3}+3|$$


$$= 2\sqrt{3} + 1 + 2\sqrt{3} - 3$$

$$= 4\sqrt{3} - 2$$

$$= 2(2\sqrt{3} - 1)$$

حل المترىج الثانية:

١- تحليم النقطة:



٢- إيجاد إحداثيات النقطة D متى
نحوه ABCD متوازي أضلاع:

$$\vec{AB} = \vec{DC} \text{ متوازي أضلاع معناه } ABCD$$

$$\vec{AB} \left(\begin{matrix} -3 - (-2) \\ -2 - 3 \end{matrix} \right) \Rightarrow \vec{AB} \left(\begin{matrix} -1 \\ -5 \end{matrix} \right) \text{ لذى}$$

$$\vec{DC} \left(\begin{matrix} 3 - x \\ 1 - y \end{matrix} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -1 = 3 - x \\ -5 = 1 - y \end{array} \right. \text{ لذى } \vec{AB} = \vec{DC} \text{ معناه}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = 6 \end{array} \right. \text{ لذى } D(4, 6) \text{ معناه}$$

٣- معادلة المترىج (AB)

لدينا $x_A = -2$ - اذن $x_B = -3$

ومنه المعادلة المترىج (AB) لا يوازي محو، الترتيبية

معادلة من التشكيل $y = ax + b$

$$a = \frac{3 - (-2)}{-2 - (-3)} = \frac{3 + 2}{-2 + 3} = \frac{5}{1} = 5$$

$$\therefore y = 5x + b$$

ولدينا $A(-2, 3) \in (AB)$ معناه

$$3 = 5(-2) + b \quad \text{اذن } b = 13$$

$$y = 5x + 13 \quad \text{اذن معادلة معنجم (AB) هي}$$

٤- معادلة المترىج (AB) متوازي افواز (CD)

لسنة $M(x, y)$ متى المترىج (AB) متوازي افواز (CD)
ولدينا المترىج (AB) و (CD) متوازيان
معناه المترىجان \vec{AB} و \vec{CD} مترتبان خطيا

$$\vec{AC} \left(\begin{matrix} 3 - (-2) \\ 1 - 3 \end{matrix} \right) \Rightarrow \vec{AC} \left(\begin{matrix} 5 \\ -2 \end{matrix} \right) \text{ لذى} \\ \vec{(x+1)} \\ \vec{(y+1)}$$

حسب شرط الارتباط الخطير بـ

$$5(y+1) - 1 \cdot 2(x+1) = 0$$

$$5y + 5 + 2x + 2 = 0 \quad \text{اذى}$$

$$5y = -2x - 7 \quad \text{اذى}$$

$$y = \frac{-2}{5}x - \frac{7}{5} \quad \text{اذى}$$

٥- تعيين فى Δ حتى تكون المتوازي F, C, A .

في- استعراضية:

النقط A و F في استعراضية معناه
السچانان \vec{AF} و \vec{AC} مترتبان خطيا

$$\vec{AC} \left(\begin{matrix} 3 - (-2) \\ 1 - 3 \end{matrix} \right) \Rightarrow \vec{AC} \left(\begin{matrix} 5 \\ -2 \end{matrix} \right) \text{ لذى}$$

$$\vec{AF} \left(\begin{matrix} 6 - (-2) \\ \alpha - 3 \end{matrix} \right) \Rightarrow \vec{AF} \left(\begin{matrix} 8 \\ \alpha - 3 \end{matrix} \right)$$

حسب شرط الارتباط الخطير بـ

$$5(\alpha - 3) - (-2) \cdot 8 = 0$$

$$5\alpha - 15 + 16 = 0 \quad \text{اذى}$$

$$5\alpha = -1 \quad \text{اذى}$$

$$\alpha = -\frac{1}{5} \quad \text{اذى}$$

$$A(6, -\frac{1}{5}) \quad \text{اذى}$$

٦- حل حملية المعادلتين (d)

$$\left\{ \begin{array}{l} -5x + y = 13 \\ 2x + 5y = -7 \end{array} \right. \text{ لذى} \quad \left\{ \begin{array}{l} y = 5x + 13 \\ 5y = -2x - 7 \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} -5 \\ 2 \end{array} \right| = 5(-5) - 1 \cdot 2 = -25 - 2 = -27 \neq 0 \quad \text{لذى اكيد}$$

(4)

٣. المروءة المحكمة للأعداد:

- مروءة ٤ - بالدالة f هي $0,5,1,5,4$: $f(0)=0$

- مروءة ٥ بالدالة f هي $-2,0,2$:

$$f(-2) = f(2) = 0$$

- مروءة ٦ بالدالة f هي $2,5,2,5,-4,7,9$:

$$f(2,5) = f(-2,5) = f(-4,7)$$

٤. اخبار تغير الدالة f :

- الدالة f متزايدة تماماً على المجال

$$[0,3] \rightarrow [5,-3]$$

- ومتناقصة تماماً على المجال $[3,0]$

$$\rightarrow [3,4]$$

- وثابرة على المجال $[4,6]$.

٥. حبيبات تغيرات الدالة f :

x	-5	-3	0	3	4	6
$f(x)$	1	5	-4	5	3	3

٦. القيم الحرارى للحبيبات:

- الدالة f تصل فرميّة حدّيّة كبيرة ٥

- وتبلغها عند -3 و 3 .

- الدالة f تصل فرميّة حدّيّة صغرى هي -4 .

- وتبلغها عند 0 .

٧. شقيني الدالة f على مجموعة نصفها:

لديها $D_f = [-5,6]$ وهي غير متاظرة

بالنسبة لـ y وبالنسبة للدالة ليست

دالة زوجية ولا فردية.

ومنه الجملة (٥) نصل حل دقيق. ومنه

$$\begin{cases} 5x + y = 13 & \text{(1)} \\ 2x + 5y = -7 & \text{(2)} \end{cases}$$

$$\text{من (1) في } y = 5x + 13$$

$$\text{بال subsitute في (2) من (1) في } 2x + 5(5x + 13) = -7 \text{ معناه}$$

$$2x + 25x + 65 = -7$$

$$27x = -72$$

$$x = -\frac{72}{27} = -\frac{8}{3} \quad \text{--- (3)}$$

بتعرفي (3) في (1) نجد

$$-5\left(-\frac{8}{3}\right) + y = 13$$

$$\frac{40}{3} + y = 13$$

$$y = 13 - \frac{40}{3} = \frac{9-40}{3} = -\frac{1}{3}$$

ومنه حلول الجملة (٥) هي $(-\frac{8}{3}, -\frac{1}{3})$

التفسير البياني:

الحبيبات (AB) و (CD) يتقاطعان في

$$\text{المقطعة } (-\frac{8}{3}, -\frac{1}{3})$$

حل العتني الثالث:

٨. مجموعة تغيري الدالة f :

هي مجموعة هو اصل النقطة التي تحيي

$$D_f = [-5,6] \text{ اذن } f(D) = D$$

٩. صور الأعداد:

- صورة ٤ - بالدالة f هي 4 $f(4) = 4$

- صورة ١ - بالدالة f هي -3 $f(1) = -3$

- صورة ٥ - بالدالة f هي 5 $f(3) = 5$

- تشخيص الدالة على اكمال [٣.٣]

لديها [٣.٣] مترادفة بالنسبة لـ f
والهيكل الأساسي للدالة f مترادف بالنسبة
لمحور التربيع على مجال [٣.٣]
اذن الدالة f زوجية على مجال [-٣.٣].

~~يتحقق~~