


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول (20 نقطة)

التمرين الأول : (05 نقاط)



المنحني (C_f) في الشكل المقابل هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{6x+5}{x+2}$ و (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$.

2. نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحددها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ) على الوثيقة المرفقة مثل على حامل محور الفواصل و دون حسابها الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 .

ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها.

3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن: $1 \leq u_n \leq 5$.

4. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، و ماذا تستنتج حول تقاربها.

5. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n ب: $v_n = \frac{u_n - 5}{u_n + 1}$.

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.

ب) عبر عن v_n ثم u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

6. احسب المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{u_0 + 1} + \frac{1}{u_1 + 1} + \dots + \frac{1}{u_n + 1}$.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y التالية: $11x - 5y = 2$(E)

1. أ) أثبت أنه إذا كانت الثنائية (x, y) من \mathbb{Z}^2 حلا للمعادلة (E) فإن: $y \equiv 4[11]$.

ب) استنتج حلول المعادلة (E) .

2. ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم. نضع: $a = 5n + 2$ و $b = 11n + 4$.

أ) عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b .

ب) عين قيم n بحيث يكون $PGCD(a, b) = 2$.

ج) استنتج قيم n بحيث يكون العددين a و b أوليان فيما بينهما.

3. (أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 10.
 (ب) استنتج رقم آحاد كلا من العددين التاليين: 7^{2022} و 7^{1443} .
 (ج) عين كل الثنائيات (x, y) من $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ حلول المعادلة (E) و التي تحقق: $7^{y-2x} \equiv 9[10]$.

التمرين الثالث : (04 نقاط)

1. تحقق أن: $5^6 \equiv 1[7]$ و استنتج أن: $5^{1443} \equiv -1[7]$.
 2. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^n$.
 (أ) بين أنه من أجل كل n من \mathbb{N} أن: $4S_n = 5^{n+1} - 1$ و استنتج أن S_n و 5^n أوليان فيما بينهما.
 (ب) ليكن العدد الصحيح a . بين أن $4S_n \equiv a[7]$ إذا فقط إذا كان $S_n \equiv 2a[7]$.
 (ج) بين أن $4S_{1442} \equiv 5[7]$ و استنتج باقي قسمة S_{1442} على 7.
 (د) عين أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث يكون 7 قاسما لـ S_n .
 3. ليكن n عدد طبيعي غير معدوم. نعتبر في \mathbb{Z}^2 المعادلة: $(E) \dots \dots \dots 5^n x + S_n y = 1$.
 (أ) تحقق أن الثنائية $(5, -4)$ حل للمعادلة (E) ثم حل في \mathbb{Z}^2 المعادلة (E) .

(ب) استنتج حلول الجملة

$$\begin{cases} 5^n x - S_n y = 7 \\ PGCD(x, y) = 7 \end{cases}$$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

الجزء I : نعتبر الدالة العددية g_α المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g_\alpha(x) = x^2 - 1 + \alpha \ln x$ وليكن (c_α) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$ و α عدد حقيقي.

1. ناقش حسب قيم α وجود و عدد النقط الحدية للمنحنى (c_α) .
 2. فيما يلي نفرض $\alpha = 1$ و نضع $g_1 = g$. (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
 (ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

(ج) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$.

الجزء II : نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$.
 وليكن (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و فسر النتيجة هندسيا ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 2. (أ) بين أن المنحنى (c_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.
 (ب) ادرس وضعية (c_f) بالنسبة إلى (Δ) على المجال $]0; +\infty[$.
 3. (أ) بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ أن: $f'(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$.
 (ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]0; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.
 (ج) ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (c_f) .

4. (أ) بين أن الدالة F المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $F(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$ أصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

(ب) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيمت التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = \frac{1}{2}$ و $x = 1$.

الجزء III: نعتبر الدالة العددية h المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ : $h(x) = |x| - 1 - \frac{\ln|x|}{|x|}$ وليكن (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. بين أن الدالة h زوجية.

2. اشرح كيف يتم رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه في نفس المعلم السابق (استعمل الألوان).

3. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m حيث $m \neq 0$ عدد و إشارة حلول المعادلة $e^{h(x)} = |m|$.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني (20 نقطة)

التمرين الأول : (04 نقاط)

(u_n) متتالية عددية معرفة بحددها الأول $u_0 = 6$ وبالعلاقة التراجعية $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 3} - 3$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن : $-2 \leq u_n \leq 6$.

2. (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن : $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n + 2)(u_n + 3)}{\sqrt{u_n + 3} + u_n + 3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغيير المتتالية (u_n) ثم برر تقاربها.

3. (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن : $0 \leq u_{n+1} + 2 \leq \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

(ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n أن : $0 \leq u_n + 2 \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4. من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. بين أن $-2(n+1) \leq S_n \leq 16\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) - 2(n+1)$.

التمرين الثاني : (05 نقاط)

1. نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث : $(E) \dots\dots\dots 63x + 5y = 159$.

(أ) تحقق أن العددين 63 و 5 أوليان فيما بينهما ثم بين أن المعادلة (E) تقبل حلولاً.

(ب) عين الحل الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق : $x_0 + y_0 = -3$ ثم استنتج حلول المعادلة (E) .

(ج) عين كل الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق : $|13x + y - 33| < 4$.

2. A عدد طبيعي يكتب $5\alpha 0\alpha$ في نظام التعداد ذي الأساس 7 و يكتب $\overline{\beta 10\beta 0}$ في نظام التعداد ذي الأساس 5.

(أ) جد العددين الطبيعيين α و β ثم اكتب العدد $(A+7)$ في النظام العشري.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ج) عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق : $\begin{cases} 3^{4n} + 3^n - A \equiv 0[5] \\ n \equiv 0[3] \end{cases}$ و $35 < n < 65$.

التمرين الثالث : (04 نقاط)

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 100 \\ u_1 \times u_3 = 256 \end{cases} \quad (u_n) \text{ متتالية هندسية متزايدة تماما حدودها موجبة تماما تحقق:}$$


1. أ) احسب u_2 ثم u_1 و u_3 .
- ب) احسب q أساس المتتالية (u_n) ثم عبر عن u_n بدلالة n .
2. احسب المجموع بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + u_3 + \dots + u_n$ ، ثم الجداء $P_n = u_0 \times u_1 \times u_3 \times \dots \times u_n$.
3. أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 5.

ب) بين أن العدد $2 \times 47^{1443} + 7^{2022}$ مضاعف للعدد 5.

ج) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد $1954^{1443} + 1979^{2022} + 5n - 2$ على 5.

4. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n نضع $T_n = \frac{1}{\ln 2} [\ln 4 + \ln 4^2 + \dots + \ln 4^n]$

احسب T_n بدلالة n ثم عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $T_n + 7^{2022} - n^2 \equiv 0 [5]$.



التمرين الرابع : (07 نقاط)

الجزء I : المنحني البياني (C_g) في الشكل المقابل هو التمثيل البياني

للدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = 2x + 1 + e^{2x}$.

1. شكل جدول تغيرات الدالة g على \mathbb{R} .
2. أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $[-0.7; -0.6]$.

ب) استنتج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R} .

الجزء II : نعتبر الدالة العددية f المعرفة \mathbb{R} بـ: $f(x) = 1 - x + (x+1)e^{-2x}$

ولیکن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

2. أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$.

ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) على \mathbb{R} .

3. أ) بين أنه من أجل كل x من \mathbb{R} أن: $f'(x) = -g(x)e^{-2x}$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f على \mathbb{R} ثم شكل جدول تغيراتها.

ج) أثبت أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) عند نقطة يطلب تعيين فاصلتها، حيث $(T): -x + 1 + \frac{1}{2}e$.

4. بين أن $f(\alpha) = \frac{-2\alpha^2}{2\alpha + 1}$ ثم أوجد حصارا لـ $f(\alpha)$.

5. احسب $f(0)$ و $f(1)$ ، ثم ارسم (Δ) ، (T) و (C_f) . نأخذ $f(\alpha) \approx 2.9$.

6. عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث المعادلة $f(x) = -x + m$ تقبل حلين سالبين تماما.

7. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $I_n = \int_0^1 x^n e^{-2x} dx$

(أ) بين أن الدالة F المعرفة على \mathbb{R} بـ : $F(x) = -\frac{1}{4}(2x+1)e^{-2x}$ أصلية للدالة $x \mapsto xe^{-2x}$

(ب) بين باستعمال الكاملة بالتجزئة أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $I_{n+1} = -\frac{e^{-2}}{2} + \frac{1}{2}(n+1)I_n$

(ج) λ عدد حقيقي حيث $\lambda > 0$ ، ليكن العدد الحقيقي $A(\lambda) = \int_0^\lambda [f(x) - (-x+1)] dx$ حيث


* بين أن $A(\lambda) = \frac{1}{4} \left[3 - \frac{2\lambda+3}{e^{2\lambda}} \right]$. * ماذا يمثل العدد $A(\lambda)$. * احسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$

انتهى الموضوع الثاني

مع تمنياتنا لطلبتنا الأعزاء بالتوفيق و النجاح و السداد في شهادة البكالوريا 2022


الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:




الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:




الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:




الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:



الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:



الوثيقة المرفقة

الاسم و اللقب: القسم:

