




التمرين الأول:(12نقط)



خلال الالعاب الاولمبية التي جرت بالبرازيل سنة 2016، تحصل الامريكي ريان كروز (Ryan crouser) على الميدالية الذهبية في رياضة رمي الجلة لاعب القوى على اثر رمية قدرها (D) باهمال تأثير الهواء ، تمت دراسة محاكاة حركة مركز عطالة الجلة G في المعلم ($0, x, y$) المرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا ، ابتداء من لحظة رميها ($t = 0$) على ارتفاع h_0 من سطح الأرض إلى غاية ارتطامها به (الشكل-1-) فتم الحصول على المنحنيات البيانية التالي



1- بالاعتماد على المنحنيات البيانية:

..... 1-1- ماذا يمثل (البيان-2)

..... 2-1- استنتج من هذا البيان قيمة الارتفاع h_0

..... 2-2- الاعتماد على المنحنيين البيانيين (1- و 3-):

..... 2-3- حدد طبيعة حركة مركز عطالة الجلة G على المحور (OX) و (OY). برج اجابتك

..... 2-4- احسب قيمة السرعة الابتدائية V_0

..... 3-2- استنتج قيمة زاوية القذف α :

..... 3-3- لنكن S أعلى نقطة من المسار تبلغها الجلة بالنسبة لسطح الأرض:

..... 3-4- اعط اللحظة الزمنية t مرور الجلة بالنقطة S

..... 3-5- احسب اعلى ارتفاع تبلغه الجلة h :


3-3 أحسب قيمة سرعة الجسم \vec{V}_S عند النقطة S ، ثم مثل \vec{V}_S كيقيا على (البيان-2-) باختيار سلم رسم مناسب ، وأذكر خصائصه.

4-علمًا أن الجلة تصل إلى سطح الأرض عند النقطة P.

-احسب عندئذ بطریقتین أقصى مسافة افقية OD التي مكنت الرياضي من الفوز بالميدالية الذهبية .

التمرين الثاني:(8 نقاط) :

I-فيتامين C اسمه العلمي (حمض الأسكوربيك) هو دواء يباع على شكل أقراص، كل قرص يحتوي على 500mg من حمض



الأسكوربيك الشكل المقابل يمثل الصيغة المفصلة لحمض الأسكوربيك

١. اعط صيغة المجملة

3. أحسب كمية المادة الموجودة في قرص واحد؟

III-نضع في دورق حجمه $V = 250mL$ غازاً نعتبره مثالياً، ضغطه $P = 78kPa$ عند درجة حرارة $: 20^{\circ}C$

..... 1. جد كمية مادة الغاز في الدورق:

2. استنتج الكتلة المولية للغاز علماً أن كتلته في الدورق هي 864 mg :

3. اكتب عبارة الكتلة المولية بدلالة x , ثم استنتج الصيغة الجزيئية للغاز علماً أنها من الشكل $N_x O_2$:

..... 4. اختار اسم الغاز من بين الأسماء التالية و ذلك بوضع العلامة أمام الاسم المناسب:

ثاني اكسيد الأزوت. **ثلاثي اكسيد الأزوت.** رباعي اكسيد الأزوت. **خامسي اكسيد الأزوت.**

5. جد عدد جزيئات الغاز في الدورق:

يُعطى:

$$M(\text{Na}) = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M(\text{O}) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M(\text{N}) = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$$

$$R = 8,31SI \quad \text{ثابت الغازات المثالية:}$$

انٹی.